

FICHA TECNICA

ACAREX® sc es un bioinsumo producido con una cepa benéfica de *Paecilomyces fumosoroseus*, que controla ácaros plaga.

Cuando las esporas de **ACAREX®sc** entran en contacto con el cuerpo del ácaro, parasitan, germinan e invaden al huésped a través de la cutícula por medio de enzimas que la degradan, una vez dentro, el hongo libera toxinas que terminan por causar trastornos fisiológicos y daños en el sistema nervioso, hasta provocar su muerte.

1. COMPOSICION GARANTIZADA

Contenido Garantizado:	<i>Paecilomyces fumosoroseus</i> 5.0 x 10 ⁸ Conidias / cc
Porcentaje de Pureza Microbiológica:	Mínimo: 95%.
Densidad a 25 °C:	0,85 – 0,95 g/mL
pH:	5,5 – 6,4

2. CULTIVOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	EPOCA Y FRECUENCIA
Aguacate	<i>Oligonychus yothersi</i>	1-2 cc/ L	En presencia de los primeros estados de la plaga.
Aromáticas	Ácaros: <i>Tetranychus</i> sp.	2 cc/ L	Control de huevos y adultos de ácaros.
Arroz	Ácaro del arroz: <i>Steneotarsonemus spinki</i>	2 cc/ L	En presencia de los primeros estados de la plaga.
Café	Arañita roja: <i>Oligonychus yothersi</i>	1L / Ha	En presencia de los primeros estados de la plaga
Cannabis	Ácaros: <i>Tetranychus</i> sp.	2 cc/ L	Control de huevos y adultos de ácaros.
Cítricos	<i>Oligonychus</i> sp., <i>Tetranychus</i> sp. Acaro tostador, <i>Phyllocoptruta oleivora</i> , <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	1-2 cc/ L	En presencia de los primeros estados de la plaga.
Flores	Ácaros: <i>Tetranychus urticae</i> <i>Tetranychus cinnabarinus</i>	2 cc/ L	En presencia de los primeros estados de la plaga.

FICHA TECNICA

Frutales	Ácaros: <i>Tetranychus</i> sp.	1-2 cc/ L	Control de huevos y adultos de ácaros.
Gulupa	Acaro o arañita roja: <i>Tetranychus</i> sp.	2 cc/ L	Control de huevos y adultos de ácaros.
Hortalizas	Ácaros: <i>Tetranychus</i> sp.	400 cc / Ha	En presencia de los primeros estados de la plaga
Menta	Ácaros: <i>Tetranychus urticae</i>	2 cc / L	En presencia de los primeros estados de la plaga.
Ornamentales	Ácaros: <i>Tetranychus</i> sp.	2 cc/ L	Control de huevos y adultos de ácaros.
Otros frutales (fresa, lulo, cítricos)	Acaro o arañita roja: <i>Tetranychus</i> sp, <i>Phyllocoptruta oleivora</i>	2 cc/ L	Control de huevos y adultos de ácaros.

3. PRESENTACIÓN.

- Envase 500 mL.
- Envase 1 Litro.
- Envase 4 Litros. (Galón)
- Envase 20 litros.

4. CONSERVACION.

Para almacenamiento inferior a 6 meses, manténgase a temperatura ambiente, no mayor a 25 ° C; Para almacenamiento de 12 meses, manténgase refrigerado entre 2 ° C y 9 ° C.

5. CATEGORIA TOXICOLOGICA



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA IV
LIGERAMENTE TOXICO



6. COMPATIBILIDADES.

- No debe usarse en mezcla con Fungicidas
- Puede usarse con Coadyuvantes que no tengan alcohol
- Compatible con la mayoría de Insecticidas, Herbicidas, Acaricidas, fertilizantes, se recomienda hacer mezclas de previas.
- No se debe mezclar con Cobre, Azufre o productos de reacción alcalina.

7. PRECAUCIONES.

- Evitar cualquier contacto innecesario con el producto.
- No congelar.
- No someter el producto a temperaturas mayores a 25 ° C.



FT 8001
Actualizada:
2022-07-09
Versión: 2

FICHA TECNICA

- No fume, ni consuma alimentos durante el manejo del producto.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Destruir el envase y sus componentes después de usado.

El periodo de reingreso: tiempo entre la aplicación y el reingreso al lote es de 2 horas.

El periodo de carencia: tiempo desde la aplicación hasta la cosecha es de 4 horas.

8. No-GMO1.

Los insumos e ingredientes utilizados en la fabricación de ACAREX® sc no fueron producidos usando técnicas de ingeniería genética y no son derivados de organismos modificados genéticamente.

9. EMPRESA PRODUCTORA

BIO-CROP S.A.S.

Registro de Venta ICA: 7563

Directo Clientes: (+57) 311-7134696 / (+57) 310-2457694

Oficina PBX: (+57) 310-4015754 / (+57)-602-2864646 ext. 2

Carrera 24 N° 21 – 31 Palmira- Valle- Colombia.

Página web: www.bio-crop.com

