

Forum® 500 WP

Fungicida • Polvo mojable • Categoría toxicológica: III

BASF
The Chemical Company



Reg. ICA 3936

Ingrediente activo

Dimetomorf 500 g/kg.

Modo de acción

Forum® 500 WP es un fungicida que posee acción sistémica translaminar.

Mecanismo de acción

• *Dimetomorf*: pertenece al grupo de los

ácidos carboxílicos. Actúa en el patógeno inhibiendo la formación, germinación y liberación de las esporas. Inhibe la formación de precursores de la pared celular, lo que ocasiona la liberación del esporangio y la elongación del esporangióforo.

Presentaciones

120 g, 1.0 kg.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Blanco biológico (Nombre científico y nombre común)	Dosis	Periodo de carencia	Periodo de reentrada
Papa - tomate	Gota (<i>Phytophthora infestans</i>)	0.6 a 0.8 kg/ha	16 días / 7 días	12 horas
Melón	Mildeo (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	0.6 a 0.8 kg/ha	7 días	12 horas
Uva	Mildeo (<i>Plasmopara viticola</i>)	0.6 a 0.8 kg/ha	19 días	12 horas
Cebolla	Mildeo (<i>Peronospora destructor</i>)	0.6 a 0.8 kg/ha	7 días	12 horas
Rosas	Mildeo (<i>Peronospora sparsa</i>)	0.6 a 0.8 g/L	Cuando seque el producto	12 horas
Tabaco	Pataprieta (<i>Phytophthora parasitica</i> var. <i>Nicotianae</i>)	0.5 a 0.6 kg/ha (Volumen de agua 500 L/ha en drench)	No aplica	No aplica

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Frecuencia y época de aplicación

- **Papa, tomate, cebolla, melón y uva:** Aplicar Forum® 500 WP 0.6 a 0.8 kg/ha en mezcla con fungicidas protectantes (Mancozeb, clorotalonil, fentin hidróxido, metiram).
- **Rosas:** Aplicar Forum® 500 WP a 0.4 g/L en mezcla con fungicidas protectantes como clorotalonil o metiram.
- **Flores y hortalizas:** efectúe aspersiones de Forum® 500 WP de manera preventiva o al observar los primeros síntomas de hongo, comenzando las aplicaciones cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Repetir cada 8 a 14 días, según condiciones ambientales. Cada 8 días en tiempo lluvioso; cada 14 días en tiempo seco.
- **Tabaco:** Forum® 500 WP se debe aplicar de manera preventiva. Realizar dos (2) aplicaciones dirigidas al cuello de la planta (drench) a los 2 - 4 días después de trasplante (DDT) y a los 20 días DDT.

Preparación de la mezcla

Emplear equipo con agitador. Llenar el tanque con agua hasta la mitad. Diluir la cantidad necesaria de Forum® 500 WP en 2 o 3 litros de agua (premezcla). Agregar esta mezcla en el tanque con el agitador funcionando y luego completar con agua, manteniendo la agitación hasta terminar con la aplicación.

Equipos

Puede ser aplicado con equipo manual o terrestre. Calibre el equipo antes de aplicar el producto. Para la aplicación utilice boquillas de cono sólido o cono hueco. Lave el equipo después de cada jornada de trabajo

Compatibilidad

Forum® 500 WP es compatible con la mayoría de los agroquímicos y fertilizantes de uso común excepto con los de reacción fuertemente alcalina. Se recomienda realizar pruebas de fitocompatibilidad antes de mezclar con otros productos.