AGRIFOS® 400 SL

Concentrado Soluble

Fungicida

Reg. ICA 4116


A nombre de: ISAGRO COLOMBIA S. A. S.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente activo:

Fosfito monopotásico y dipotásico: 45.8%,

equivalente a ácido fosforoso 400 g/L



RECOMENDACIONES DE USO:

| Cultivo | Enfermedad | Dosis |
|----------|--|---|
| Arroz | Añublo de la vaina Rhyzoctonia solani | 3.0-3.5 L/Ha. |
| Cebolla | Mildeo velloso Peronospora destructor | 1 L/Caneca de 200 Litros. |
| Papa | Gota Phytophthora infestans | 1 L/Caneca de 200 Litros, antes de la aparición de los primeros síntomas (3 L/Ha en promedio). 0.8-1 L de AGRIFOS® SL en mezcla con 0.5 kg de VONDOZEB 80 WP cuando las condiciones climáticas sean muy favorables para el desarrollo de la enfermedad. |
| Rosa | Mildeo velloso Peronospora sparsa | 4-5 cm3/Litro de agua. |
| Aguacate | Pudrición radicular Phytophthora cinnamoni | 7.5 cm3/metro de diámetro de copa de árbol (inyectado), disuelva en proporción 1:1 e inyecte 20 cm3 de la solución en cada una de las perforaciones distribuidas cada 20 cm en forma de espiral a lo largo del tallo, iniciando aproximadamente, a unos 20 cm de la base. |

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar AGRIFOS® 400 SL antes de la aparición de los síntomas de la enfermedad. Repetir cada 8 a 15 días dependiendo de las condiciones climáticas (Iluvia, humedad relativa y temperatura).

En épocas de alta humedad relativa y lluvias las cuales son propicias para el desarrollo de las enfermedades, se recomienda aplicar el producto en mezcla con Vondozeb 80 WP (Mancozeb 80%).

PRESENTACIÓN: Frasco por 1, 4, 20 Litros, tambor por 200 Litros.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III

MEDIANAMENTE TÓXICO



5/5/23, 07:55 Agrifos400sl__

DISTRIBUIDO POR:

ISAGRO COLOMBIA S.A.S.