

## Composición:

720 g/lit (2-4 dichlorofenoxy) ácido acético.

## Características físicas y químicas:

Familia química:	Fenoxi
Clasificación toxicológica:	II
Usos:	Herbicida

## Modo de acción:

Es un herbicida hormonal de baja volatilidad para uso de caña de azúcar y otros cultivos gramíneos, altamente sistémico, aplicado al follaje de las malezas en activo crecimiento penetra por las hojas y partes verdes jóvenes, es movilizado por toda la planta en forma acropétala y basipétala; posee un amplio espectro de control de malezas de hoja ancha.

## Usos:

Cultivo	Malezas a controlar Nombre común (Nombre científico)	Dosis/ha	P.C. Días	P.R. Horas
CAÑA	Verdolaga <i>Portulaca oleracea</i> Batatukka <i>Ipomea congesta</i> Escoba <i>Sida acuta</i> Botoncillo <i>Eclipta alba</i> Viernes santo <i>Phyllanthus niruri</i> Yerba de Sapo <i>Euphorbia hirta</i> Uchuva <i>Physalis angulata</i>	3 Lt/ha	15	12
POTREROS	Bledo <i>Amaranthus dubius</i> Emilia <i>sochifolia</i> Escoba <i>Sida acuta</i> Pega pega <i>Desmodium tortuosum</i> Dormidera <i>Mimosa pudica</i> Amor seco <i>Bidens pilosa</i>	2 Lt/ha	15	12

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de PRECISAGRO.

ARROZ	Amor seco <i>Bidens pilosa</i> Yerba de sapo <i>Euphorbia hirta</i> Hierva de chivo <i>Ageratum conyzoides</i> Pega pega <i>Desmodium tortuosum</i> Verdolaga <i>Portulaca oleracea</i> Tabaquillo <i>Emilia sonchifolia</i>	1,3 Lt/ha	15	12
-------	---	-----------	----	----

P.C.: Período de carencia: Intervalo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R.: Período de Reingreso: Período que debe transcurrir entre la última aplicación y la reentrada al área aplicada.

N.A.: No aplica

**Presentaciones:**

1L, 4L.

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de PRECISAGRO.

Versión 01