


ANTRACOL® WP 70



Polvo mojable WP
Ditiocarbamato
Fungicida agrícola
Reg. Venta ICA 0304
Titular del Registro Bayer S. A.

Composición garantizada:

Ingrediente activo: PROPINEB: 700 g/kg polymeric zinc 1,2 propylenebis (dithiocarbamate) de formulación a 20 °C.

Ingredientes aditivos:.....c.s.p. 1 kg

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Precauciones y advertencias de uso y aplicación:

- Utilizar ropa de protección adecuada al manipular, aplicar el producto; y para ingresar al área tratada antes de terminar el periodo de reentrada.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de aplicar el producto báñese con abundante agua y jabón, lave la ropa contaminada.
- No permita animales en el área tratada.
- Verificar el buen estado del equipo de aplicación y calíbrelo previamente
- “Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No reenvase el producto”.
- No almacenar en casas de habitación. Almacene el producto en sitios seguros retirados de alimentos y medicinas de consumo humano y animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco, seco y ventilado).
- Transpórtelo solamente con productos agroquímicos, NO con productos de consumo humano y animal.
- Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas durante 48 horas.

Instrucciones de primeros auxilios:

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta adjunta.
- En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua por mínimo 15 minutos, cubra el ojo afectado y lleve al paciente al médico.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y bañe al paciente con abundante agua y jabón y lleve al médico.
- En caso de intoxicación por inhalación, retire la víctima de la zona de contaminación, lleve al aire libre y mantenga al paciente acostado de medio lado y vigile que éste respire.
- Induzca el vómito si el tiempo transcurrido desde la ingestión es menos a una hora, si la persona está totalmente consciente posteriormente de a beber una suspensión de carbón activado en 150 – 200 ml de agua.

Guía para el médico:

- Medidas de descontaminación general. Si ha sido ingerido, practicar lavado gástrico. Terminando con carbón activado y sulfato sódico
- No hay un antídoto específico por lo tanto cualquier tratamiento debe ser sintomático
- Contraindicación: Atropina

Bayer CropScience una división de Bayer S. A.
Línea 01 8000 111 212
Bogotá, D.C., Colombia
® Marca Registrada

Medidas para la protección del medio ambiente:

- En caso de derrame, recoger con materiales absorbentes (aserrín o tierra seca), guardarlo en bolsa plástica y/o caneca y deseche acorde con la entidad local competente.
- No asperjar áreas fuera del cultivo a tratar. Lave el equipo en el sitio de la aplicación y deseche esta agua en el área tratada.
- No contaminar lagos, ríos, estanques ni arroyos con desechos o envases vacíos.
- Respetar las franjas de seguridad en relación a los cuerpos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, o cualquier otra área que requiera protección especial 10 metros (terrestre) y 100 metros (aérea).

Se prohíbe la utilización de este envase para contener alimentos o agua para consumo

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Generalidades:

ANTRACOL® WP 70 es un fungicida preventivo protectante con amplio espectro; de acción multisitio afectando la respiración celular del hongo.

P.C. Periodo de carencia: Arroz, Cacao, Cafeto, Cebolla, Clavel, Cucurbitáceas, Frijol, Papa, Tomate, Vid: 8 días.

P.R. Periodo restringido (no prohibido) entre la aplicación y reentrada del personal al área aplicada 4 horas siempre verifique que la superficie foliar este seca si requiere realizar alguna labor antes de cumplirse el periodo de reingreso (ej. monitoreo de la aplicación) debe utilizar overol, botas y guantes

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda la aplicación de **ANTRACOL® WP 70** con base en los resultados del monitoreo de las diferentes enfermedades. Debe ser aplicado dentro de un programa de rotación con otros fungicidas de diferente mecanismo de acción, siguiendo las recomendaciones del comité de prevención de resistencia a fungicidas FRAC y complementando con prácticas de manejo integrado de cultivo.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: **ANTRACOL® WP 70** es compatible con la mayoría de los productos de uso agrícola y no existen restricciones en su uso conocidas hasta la fecha, sin embargo, se recomienda antes de efectuar mezclas, realizar previamente pruebas de compatibilidad con el producto que se desea mezclar. **ANTRACOL® WP 70** en las dosis y frecuencia recomendadas, es compatible con los cultivos registrados, sin embargo, se recomiendan pruebas de fitocompatibilidad con nuevas variedades y/o híbridos.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD: El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las instrucciones dadas.

PRESENTACIONES: 400 gr y 5 Kg.

PRECAUCIÓN

Categoría toxicológica: III MEDIANAMENTE TÓXICO

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A: CISPROQUIM, Teléfono (91) 2886012, Bogotá D.C., Colombia.

Fuera de Bogotá, Línea 01 8000 916012. (Servicio gratuito, 24 horas).

CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Bayer CropScience una división de Bayer S. A.

Línea 01 8000 111 212

Bogotá, D.C., Colombia

® Marca Registrada