



Borneo[®] 11 SC

ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSION CONCENTRADA SC

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Ingrediente Activo:

ETOXAZOLE..... 110 g/l

(RS)-5-tert-buthyl-2-((2,6-difluorophenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-4-yl)) Phebetole.

Ingredientes Aditivos:.....c.s.p. 1 litro

Registro de venta ICA No. 4 2 0 6

Titular del Registro: SUMITOMO CORPORATION COLOMBIA S.A.

Formulado por: *SUMITOMO CHEMICAL Co. Ltd.*
27-1, Shinkawa 2-Chome, Chuo-Ku, Tokio, 104-8260, Japón.

Importado y Distribuido por:  **SUMITOMO CORPORATION COLOMBIA S.A.**
Calle 113 N. 7 – 21 Torre A. Oficina 1111.
Tel.: (57-1) 629 2171 - Fax: (57-1) 629 2282. Bogotá, D.C. Colombia.

**CATEGORIA TOXICOLOGICA III
MEDIANAMENTE TOXICO
CUIDADO**





LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION:

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre **“No comer, fumar o beber durante el manejo y aplicación”**.

Durante las aplicaciones terrestres **“Utilice ropa de protección adecuada durante la preparación y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 6 horas”** además equipo de protección completo gafas, careta facial, guantes de PVC o nitrilo, overol de PVC y botas de caucho, mascarilla provista de cartucho contra polvos y vapores.

“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”, en caso de inhalación: trasladar al paciente a un sitio con aire fresco.

“Conservar el producto en el envase original y etiquetado y cerrado”.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

No han sido determinados síntomas específicos **“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta”**.

En caso de ingestión y si el paciente está consciente, **“LLAME INMEDIATAMENTE AL MÉDICO, NO SUMINISTRE SUSTANCIAS LÍQUIDAS.”** En caso de contacto con los ojos, enjuague los ojos con un delicado chorro de agua limpia, manteniendo el párpado abierto. Hacer esto por lo menos durante 15 minutos. En caso de presentarse irritación, acuda al médico para seguir con el tratamiento en forma profesional. Si el contacto fuese con la piel, quítese toda la ropa contaminada de inmediato, lávese las partes expuestas de la piel con abundante agua y jabón.

Se recomienda tratamiento sintomático.

En caso de emergencia comuníquese con
CISTEMA-SURATEP: 01 8000 51 14 14 (24 Horas)





MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

No permita que el producto caiga en estanques, ríos, lagos o demás fuentes de agua. No arroje los sobrantes a las fuentes de agua.

Para la aplicación del producto, dejar franjas de seguridad de 10 metros en relación a cuerpos de agua y núcleos de población animal o humana.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacene el producto en su empaque original, bien sellado, con la etiqueta en buen estado, manténgalo en un lugar fresco y seco, lejos de casa de habitación, alimentos y drogas. Este producto es estable por dos años bajo óptimas condiciones de almacenamiento.

ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDA DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO HUMANO”.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO Ó PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Fecha de Aprobación ICA: _____



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:





“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

BORNEO®11 SC es un nuevo acaricida regulador de crecimiento IGR. Con actividad transovárica sobre adultos (hembras) y actividad sobre huevos y ninfas. Inhibe el proceso de la muda, impidiendo el crecimiento de los estados juveniles. La mejor aplicación de **BORNEO 11 SC** es en infestaciones tempranas cuando se registren pocos huevos y larvas por hoja, de lo contrario debe ser usado en combinación con otros productos que controlen adultos.

| Cultivo | Plagas | Dosis (cc/l) | Volumen de aplicación | Período de Carencia |
|---------|--|--------------|----------------------------|---------------------|
| Rosa | Arañita Bimaculada (<i>Tetranychus urticae</i>) | 0.3-0.45 | 1200 – 1500 litros de agua | No aplica |
| Clavel | Arañita Roja Carmín (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>) | 0.3 - 0.45 | 1200 – 1500 litros de agua | No aplica |
| Fresa | Complejo: Ácaro del Ciclamen (<i>Stenotarsonemus pallidus</i>) y Arañita Bimaculada (<i>Tetranychus urticae</i>) | 0.3 | 400 – 800 litros de agua | 2 días |
| Uchuva | Complejo: Ácaro Tostador del Tomate (<i>Aculops lycopersici</i>), Ácaro del Brote (<i>Phytonemus pallidus</i>) y Ácaro de los Hongos (<i>Tarsonemus setifer</i>) | 0.3 | 400 – 800 litros de agua | |

Período de reentrada: 12 horas

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

Aplicar con intervalo de 5 a 7 días de acuerdo a las condiciones del clima y el desarrollo de las poblaciones de ácaros.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

BORNEO 11 SC no es fitotóxico. Las mezclas de productos agroquímicos, fertilizantes, coadyuvantes o reguladores fisiológicos efectuadas con **BORNEO 11 SC**, deben ser probadas previamente en cantidades y áreas pequeñas para confirmar su compatibilidad. Dichas mezclas siempre deben usarse inmediatamente después de su preparación y no deben dejarse de un día para otro.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL.

“El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

