



BOROVAL

Ficha técnica

Características químicas y físicas

COMPOSICION

P/V

Boro (B).....15.0%

Formulación :líquida
Coloramarillo
pH (1%).....7.7
Conductividad (1‰) mS/cm 18°C0,196
Densidad (g/ml) 25 °C.....1.370

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS

BOROVAL es un integrador foliar a base de boro complejado con etanolamina que tiene la capacidad de ser absorbido perfectamente por hojas, tallo y raíz.

El boro favorece el transporte y la acumulación de azúcares en los tejidos de reserva (frutos, semilla, tallos, raíces y tubérculos), es indispensable para la elongación del tubo polínico, estimula la actividad enzimática y la absorción de microelementos.

En todos los cultivos tiene efecto positivo sobre producción y calidad.

BOROVAL es un producto específico y de alta eficacia para prevenir y curar las deficiencias de boro.

MODALIDAD DE EMPLEO:

Aplicación foliar, fertirrigación





DOSIS:

Foliar:

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACION	DOSIS POR APLICACION
Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>) Chile(<i>Capsicum annuum</i>) Berenjena (<i>Solanum melongena</i>) Melón (<i>Cucumis melo</i>) Sandía (<i>Cucurbita citrullus</i>) Pepino (<i>Cucumis sativus</i>) Calabacita (<i>Cucurbita pepo</i>) Fresa (<i>Fragaria vesca</i>)	A partir de pre floración, 2-3 aplicaciones distanciadas 7-10 días. En caso de variedades indeterminadas, aplicar cada 10 días durante todo el ciclo	80-100 ml/100 litros
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>) Zanahoria (<i>Daucus carota</i>)	Durante el llenado del tubérculo o de la raíz, cada 10-15 días	0,8-1 litro/ha
Vid (<i>Vitis vinifera</i>) Manzano (<i>Malus sativus</i>) Citricos (<i>Citrus spp.</i>)	Pre floración, floración, cuajado, post cosecha	80-120 ml/100 litros
Durazno (<i>Prunus persica</i>) Ciruelo (<i>Prunus domestica</i>) Cerezo (<i>Prunus avium</i>, <i>P. cerasus</i>) Nogal (<i>Juglans regia</i>)	Pre floración, floración, cuajado, post cosecha	40-60 ml/100 litros
Mango (<i>Mangifera indica</i>) Café (<i>Coffea spp.</i>) Aguacate (<i>Persea americana</i>) Cacao (<i>Theobroma cacao</i>)	Prefloración, floración y cuajado	50-70 ml/100 litros
Piña (<i>Ananas comosus</i>)	Cada 15 días	100-120 ml/100 litros
Flores y ornamentales	Cada 10-15 días	30-50 ml/100 litros
Col, repollo, brócoli (<i>Brassica spp.</i>)	Cada 10-15 días	150-200 ml/100 litros
Caña de azúcar	Cada 25-30 días	1-1,5 litros/ha
Agave (<i>Agave spp.</i>)	Cada mes	80-100 ml/100 litros
Algodón (<i>Gossipium spp.</i>)	2-3 aplicaciones durante la formación de la cápsula	60-80 ml/100 litros

Fertirrigación: 3-6 l/ha

Advertencia: las dosis indicadas son fruto de amplia experimentación, sin embargo las indicaciones son datos promedio, por lo tanto será necesario hacer ajustes de las mismas dosis, de acuerdo con las condiciones edáficas, climáticas, varietales y de manejo local.

Departamento Agronómico
VALAGRO S.p.A.

