

BREXIL Fe

Ficha técnica

Características químicas y físicas

COMPOSICION

P/P

Hierro (Fe) complejoado con LPCA.....10,0%

.

Formulación :microgranulo

Colormarrón

pH (1%).....3.3

Conductividad (1‰) mS/cm 18°C0.450

Solubilidad (g/100 ml a 20 °C).....40.0

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS

BREXIL Fe es una formulación a base de Hierro complejoado con LPCA (Acido Lignin Poli Carboxilico), un agente complejante natural de origen vegetal.

BREXIL Fe pose caracterisitcas de alta eficiencia (rápida absorción), ausencia de fitotoxicidad, compatibilidad en mezclas con agroquímicos o fertilizantes. Ideal para la prevención y el tratamiento sintomático de las deficiencias de Hierro es recomendado en aplicaciones preventivas y curativas en todos los cultivos sensibles a la deficiencia de Hierro

MODALIDAD DE EMPLEO:

Foliar, fertirrigación

DOSIS:

FOLIAR

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACION	DOSIS POR APLICACION
Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>) Chile(<i>Capsicum annuum</i>) Berenjena (<i>Solanum melongena</i>) Melón (<i>Cucumis melo</i>) Sandía (<i>Cucurbita citrullus</i>) Pepino (<i>Cucumis sativus</i>) Calabacita (<i>Cucurbita pepo</i>) Fresa (<i>Fragaria vesca</i>) Fríjol (<i>Phaseolus vulgaris</i>) Lechuga (<i>Lactuca sativa</i>) Col, repollo, Brócoli (<i>Brassica spp.</i>)	Post trasplante, pre floración y todos los casos de deficiencia	100-150 g/100 litros

Acelga (<i>Beta vulgaris</i>)		
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>) Zanahoria (<i>Daucus carota</i>) Soja (<i>Glycine maxima</i>) Garbanzo (<i>Cicer arietinum</i>) Alfalfa (<i>Medicago sativa</i>) Piña Cebolla (<i>Allium cepa</i>) Cebollín (<i>Allium schoenoprasum</i>) Ajo (<i>Allium sativum</i>) Cacahuate	En todos casos de deficiencia	1,5-2,5 kg/ha
Durazno (<i>Prunus persica</i>) Ciruelo (<i>Prunus domestica</i>) Cerezo (<i>Prunus avium</i>, <i>P. cerasus</i>) Nogal (<i>Juglans regia</i>) Mango (<i>Mangifera indica</i>) Cacao (<i>Theobroma cacao</i>) Café (<i>Coffea spp.</i>)	Inicio crecimiento vegetativo, pre floración, post cosecha y en todos los casos de deficiencia	100-150 g/100 litros
Cítricos (<i>Citrus spp.</i>) Aguacate (<i>Persea americana</i>)	Cada 30 días	200-250 g/100 litros
Vid (<i>Vitis vinifera</i>) Manzano (<i>Malus sativus</i>)	Inicio crecimiento vegetativo, pre floración, post cosecha y en todos los casos de deficiencia	150-200 g/100 litros
Banano y plátano (<i>Musa spp.</i>)	Cada 30 días	1,5-2,5 kg/ha
Flores y ornamentales	En todos casos de deficiencia	100-150 g/100 litros
Algodón (<i>Gossipium spp.</i>)	1-2 aplicaciones durante la formación de las cápsulas	100-150 g/100 litros
Trigo (<i>Triticum aestivum</i>) Arroz (<i>Oryza sativa</i>) Maíz (<i>Zea mays</i>) Caña de azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)	Dos-tres hojas verdaderas y durante el crecimiento de los tallos (alargamiento de los entrenudos), cada 7-10 días	1,5-2,5 kg/ha

FERTIRRIGACION

Aplicable en sistemas de fertirrigación con aguas de pH entre 3 y 6.5

Frutales, hortalizas y ornamentales	Según necesidad	5-10 kg/ha
-------------------------------------	-----------------	------------

Advertencia: las dosis indicadas son fruto de amplia experimentación, sin embargo las indicaciones son datos promedio, por lo tanto será necesario hacer ajustes de las mismas dosis, de acuerdo con las condiciones edáficas, climáticas, varietales y de manejo local.

Departamento Agronómico
VALAGRO S.p.A.