

Cabrio® Top WG

Fungicida • Gránulos dispersables en agua • Categoría toxicológica: III

BASF
The Chemical Company



Registro Nacional
ICA No. 0269

Ingrediente activo

Metiram 550 g/kg +
Pyraclostrobin 50 g/kg

Modo de acción

Cabrio® Top WG es un fungicida con acción sistémica translaminar.

Mecanismo de acción

- **Metiram:** pertenece al grupo del ditiocarbamato. Interrumpe procesos bioquímicos (respiración, biosíntesis y transporte de energía) inhibiendo la ac-

tividad enzimática. Inhibe la germinación de esporas y el desarrollo del tubo germinal.

- **Pyraclostrobin:** es una estrobilurina que inhibe la respiración mitocondrial interrumpiendo el transporte de electrones en el complejo III. Actúa sobre oomicetos y un gran grupo de hongos tales como deuteromicetos y ascomicetos.

Presentaciones

500 g.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Blanco biológico (Nombre científico y nombre común)	Dosis	Periodo de carencia	Periodo de reentrada
Cebolla de bulbo Cebolla de rama	Mancha púrpura, punteo (<i>Alternaria porri</i>)	2.4 kg/ha	Para todos los cultivos: 7 días después de la última aplicación	12 horas
Fríjol	Antracnosis (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>)	2 - 2.4 kg/ha		
Tomate	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	2 - 2.4 kg/ha		

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Frecuencia y época de aplicación

Cabrio® Top WG se debe aplicar de manera preventiva cada 7 a 10 días en tomate - cebolla y cada 12 a 15 días en fríjol, o al observar los primeros síntomas de la enfermedad cuando las condiciones del ambiente sean favorables para su desarrollo.

Compatibilidad

Cabrio® Top WG es compatible con la mayoría de los agroquímicos y fertilizantes de uso común excepto con los de reacción fuertemente alcalina.

Fitotoxicidad

Se recomienda realizar pruebas de fitocompatibilidad antes de mezclar con otros productos.