Características

Empresa: FMC Latinoamérica S.A.

Uso: Fungicida

Ingrediente activo: IPRODIONE (175 g/L) + CARBENDAZIM (87.5 g/L)

Nombre IUPAC Iprodione: 3-(3,5dichlorophenyl)-N-isopropyl-2,4-dioxoimidazolidine-1- carboxamide. de formulación a 20°C

Nombre IUPAC Carbendazim: methyl benzimidazol-2-ylcarbamate; de formulación a 20°C

Registro de Venta ICA No. 1967

Categoría Toxicológica: III MEDIANAMENTE TOXICO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
AGITESE ANTES DE USAR

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Causa irritación a los ojos. Evite el contacto con la piel y la ropa
- Nocivo si es ingerido. No aspire sus vapores o la neblina de aspersión
- Utilizar ropa de protección adecuada al manipular, aplicar el producto; y para ingresar al área tratada durante las primeras 6 horas. (guantes, botas, visor, overol, delantal).
- Utilice protección respiratoria (respirador ó mascara) cuando manipule ó use el producto en invernaderos.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de aplicar el producto báñese con abundante agua y jabón, lave la ropa contaminada.
- No emplear utensilios domésticos para medir o mezclar el caldo de aspersión. Usar instrumentos de medición adecuados y previamente marcados para su fácil identificación. No mezclar el producto o la mezcla con la mano
- Verificar el buen estado del equipo de aplicación y calíbrelo previamente
- No sople con la boca las boquillas obstruidas; utilice un cepillo para destaparlas
- Mantenga a los animales y personas alejados del área tratada.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No re-envase el producto
- No almacenar en casas de habitación. Almacene el producto en sitios seguros retirados de alimentos y medicinas de consumo humano y animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco, seco y ventilado).

- Transpórtelo solamente con productos agroquímicos, NO con productos de consumo humano y animal

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta adjunta.
- En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua por mínimo 15 minutos, cubra el ojo afectado y lleve al paciente al médico.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y bañe al paciente con abundante agua y jabón y lleve al médico.
- En caso de intoxicación por inhalación, retire la víctima de la zona de contaminación, lleve al aire libre y mantenga al paciente acostado de medio lado y vigile que éste respire.

GUIA PARA EL MÉDICO.

- Medidas de descontaminación general, Si ha sido ingerido, practicar lavado gástrico con aproximadamente cuatro (4) litros de agua luego administre carbón activado y sulfato sódico
- Induzca el vómito si el paciente está consciente
- Tratamiento sintomático y de sostén

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- En caso de derrame, recoger con materiales absorbentes (aserrín o tierra seca), guardarlo en bolsa plástica y/o caneca y deseche acorde con la entidad local competente.
- No asperjar áreas fuera del cultivo a tratar. Lave el equipo en el sitio de la aplicación y deseche esta agua en el área tratada
- No contaminar lagos, ríos, estanques ni arroyos con desechos o envases vacíos.
- Respetar las franjas de seguridad con relación a cuerpos de agua (Aplicación terrestre: 10 metros. Aplicación aérea 100 metros)

NINGÚN ENVASE DE PLAGUICIDA DEBE UTILIZARSE PARA GUARDAR ALIMENTOS O AGUA POTABLE.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCION EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN, EVITANDO SALPICADURAS. LUEGO INUTILICELO TRITURANDOLO O PERFORANDOLO Y DEPOSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN

LLEVE EL ENVASE VACIO AL CENTRO DE ACOPIO MAS CERCANO DEL PROGRAMA CAMPOLIMPIO, LUEGO DE REALIZAR EL TRIPLE LOAVADO

EN CASO DE INTOXICACION, DERRAME O INCENDIO COMUNICARSE CON CISPROQUIM: Línea 01 8000 916012 O EN BOGOTA AL Tel. (1) 288 60 12. ATENCION 24 HORAS

CONSULTE UN INGENIERO AGRONOMO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Generalidades

CALIDAN® SC fungicida protectante y curativo, sistémico que afecta la respiración celular e inhibe la división celular del patógeno.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	[1]P.C.	[2]P.R.
ARROZ	Añublo de la vaina *Rhizoctonia solani* Manchado del grano *Helminthosporium oryzae* Escaldado de la hoja *Rhynchosporium oryzae*	1.21 a 1.5 litros / ha	15-30 días	6 horas
CEBOLLA CABEZONA	Complejo del punteo o Amarillera *Alternaria porri*	0.6 litros /ha ó 300 cm^3/ 200 litros de agua. En un programa de manejo integrado de la enfermedad se recomienda la rotación con OCTAVE ® WP	14 días	
ROSAS	Moho gris *Botrytis cinerea*	1.2 - 1.8 litros / ha ó 1.0 a 1.5 cm^3 / litro de agua	N.A	
SORGO	Complejo fungoso del grano: *Cercospora sorgui* *Colletotrichum graminicola* *Fusarium moniliforme*	1.5 litros / ha	15-30 días	
TOMATE	Tizón temprano *Alternaria solani*	0.6 - 0.8 litros/ha ó 200 - 250 cm^3/ 200 litros de agua	7 días	

N.A.: no aplica

[1]P.C. Periodo de carencia: días entre la última aplicación y la cosecha

[2]P.R. Periodo de re-entrada: 6 horas siempre y cuando la superficie foliar este seca.
Volumen de aplicación: Arroz: 100 -150 l/ha, Sorgo: 100-200 l/ha, Rosas: 1200 l/ha, Cebolla: 400 l/ha, Tomate: 400-600 l/ha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: CALIDAN® SC debe ser aplicado dentro de un programa de rotación con otros fungicidas de diferente mecanismo de acción, siguiendo las recomendaciones del Comité de Prevención de Resistencia a Fungicidas – FRAC y complementando con prácticas de manejo integrado de cultivo.

Los intervalos de aplicación dependen de las condiciones climáticas y ambientales predominantes en la zona y la presión de la enfermedad.

Arroz: las aspersiones deben hacerse antes de la floración y después del espigamiento o cuando las condiciones climáticas sean favorables para una nueva infección

Sorgo: hacer dos (2) aplicaciones por ciclo, efectuando la primera al 50% de floración y la segunda 15 a 20 días después.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: antes de efectuar mezclas, debe realizar previamente pruebas de compatibilidad (miscibilidad) y fitocompatibilidad con el producto que se desea mezclar.

CALIDAN ® SC en las dosis y frecuencia recomendadas, es compatible con los cultivos registrados, sin embargo se recomienda pruebas de fito-compatibilidad con nuevas variedades y/o híbridos

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.