

Sección 2.

CANEL[®]

Fungicida Agrícola

Polvo Mojable WP

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

DIMETOMORPH500 g/Kg
(E,Z)-4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine de formulación a 20 °C.

Ingredientes Aditivos:.....c.s.p. 1 Kg

Registro Nacional ICA No. 962

Titular del Registro: Arysta LifeScience Colombia S.A.

CONTENIDO NETO: Kg

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

No. de lote:

Importado y Distribuido por
Arysta LifeScience Colombia S.A.

Carrera 2 Este # 15 – 82
Barrio El Cortijo,
Madrid, Cundinamarca
Tel: (57) 1 8250482.
Fax: (57) 1 8252157. Colombia.



Arysta LifeScience

Formulado por:

SHANDONG CYNDA CHEMICAL CO., LTD

Boxing County Shandong Province
250500 China
Telefax: 86-53188873390
Código postal: 250100
www.cynda.cn

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

Sección 2.

CANEL[®]

Fungicida Agrícola

Polvo Mojable WP

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

DIMETOMORPH**500 g/Kg**
(E,Z)-4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine de formulación a 20 °C.

Ingredientes Aditivos:**c.s.p. 1 Kg**

Registro Nacional ICA No. 962

Titular del Registro: Arysta LifeScience Colombia S.A.

CONTENIDO NETO: Kg

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

No. de lote:

Importado y Distribuido por
Arysta LifeScience Colombia S.A.

Carrera 2 Este # 15 – 82
Barrio El Cortijo,
Madrid, Cundinamarca
Tel: (57) 1 8250482.
Fax: (57) 1 8252157. Colombia.



Arysta LifeScience

Formulado por:

Arysta Lifescience

110-1111, 11th floor
Lipro plaza 222 HJA-Ha-rdad (M)
Shangai, CHINA

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

Sección 1.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

MATÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- **Puede ser nocivo para la salud si se ingiere**

Durante las aplicaciones terrestres **“Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas”** además equipo de protección completo: overol, guantes de neopreno ó PVC, botas de caucho, gorra, anteojos irrompibles y máscara especial para plaguicidas. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión.

“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”, en caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo.

“Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado”.

Este fungicida no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos susceptibles.

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre **“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”**

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

No han sido determinados síntomas específicos. **“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta”.**

En caso de intoxicación oral suministre al paciente grandes cantidades de agua. **NO INDUZCA AL VOMITO.** **“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”.**

No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 018000916012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono (57) 1 2886012.

Sección 1. Continuación.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:

- Tóxico para organismos acuáticos. No permita que el producto contamine canales, aguas corrientes, aguas estancadas o el suelo.
- No aplicar cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto en el suelo.
- No aplicar cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre de la aspersión hacia zonas no objetivo como canales, aguas corrientes o lagos.
- En caso de escape o incidente, recoger el producto derramado con ayuda de pala y cepillo. Posteriormente, el material se debe transferir a contenedores para evitar una posible contaminación. Si se aplica agua para la limpieza, también se debe controlar su dispersión.

“Para aplicación aérea y terrestre, respetar las franjas de seguridad de 100 y 10 metros respectivamente con relación a los cuerpos de agua”.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

- Almacene lejos de alimentos, ropa, agua y medicamentos de consumo humano o animal. Evite el contacto del producto con el fuego.
- Evitar la influencia directa de temperaturas elevadas, luz solar, humedad, ácidos y bases fuertes.

ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCION EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILICELO TRITURANDOLO O PERFORANDOLO Y DEPOSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.



Fecha de Aprobación ICA: 21/11/2011

Sección 3.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

CANEL® es un fungicida sistémico local con buena acción protectora y actividad antiesporulante.

USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS / ha	P.C*	P.R**
Papa	Gota – <i>Phytophthora infestans</i>	0.7 Kg/Ha	7 días	12 horas
Tomate	Gota – <i>Phytophthora infestans</i>	0.8 Kg/Ha	7 días	12 horas
Rosa	Mildeo Velloso – <i>Peronospora sparsa</i>	0.8 Kg/Ha	N.A.	6 horas

P.C*: Periodo de Carencia: Días transcurridos entre la ultima aplicación y la cosecha.

P.R:** Periodo de Reentrada: El periodo de tiempo para el reingreso de los trabajadores a los lotes tratados es importante; se debe esperar 6 horas antes de su reingreso.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Aplíquese una vez en forma preventiva o curativa, cuando se establezcan, los primeros síntomas de la enfermedad y/o cuando las condiciones climáticas y del cultivo favorezcan el desarrollo de la enfermedad. Como fungicida preventivo-curativo en el cultivo de papa. Se debe monitorear el cultivo y las condiciones agroecológicas constantemente.

Aplicar preferiblemente con viento en calma, para evitar arrastre hacia fuentes de agua.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA.

Se recomienda aplicar el producto por aspersión foliar con la cantidad suficiente de agua para cubrir uniformemente el follaje de las plantas. Llene el tanque hasta la mitad, agregue la cantidad adecuada de producto, llenar hasta el volumen total y agitar la mezcla. Aplique bajo la dosis recomendada evitando la deriva.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD.

En caso de requerirse mezcla con otro producto, se recomienda hacer una prueba a escala antes de la aplicación. Si se utiliza este producto a las dosis recomendadas en esta etiqueta no es de esperar que se presenten problemas de fitotoxicidad.

Sección 3. Continuación.

INFORMACION SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL.

“El titular del registro garantiza que las características físico – químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.



