carboxy L

Bioestimulante para Traslocar Azúcares
Líquido

¿Qué hace?

Provoca una mayor eficiencia en la translocación de fotosintatos hacia frutos y órganos de almacenamiento.

¿Cómo lo hace?

Los ácidos ECCA Carboxy® contenidos en **Carboxy® L**, influyen en los procesos del metabolismo primario que conducen a un incremento en la fijación fotosintética del carbono y a la mayor translocación de carbohidratos de las zonas de donde se producen hacia las zonas en donde se demandan (frutos, tubérculos, tallos y coronas) en la planta, a través de los tejidos de conducción.

BENEFICIOS

- Mayor acumulación de reservas en raíces y madera para mejor brotación en frutales, berries y rosales.
- Translocación de azúcares a coronas de espárrago para mejorar la calidad de los turiones.
- Madurante no fitotóxico ni residual para caña de azúcar.

RECOMENDACIONES DE USO:

Para preparar la solución de aspersión con agua

a) Agite el envase, desenrosque la tapa y retire el sello de seguridad;
b) Mida la cantidad a aplicar en recipiente graduado y vierta en cubeta para predilución o premezcla.
c) Vierta el contenido de la cubeta en el tanque de la aspersora conteniendo la mitad del volumen de aspersión.
d) Agite y complete el total del volumen de aspersión.

Las aspersiones foliares se diluyen en un mínimo de 40 L de agua si es aplicado por avión y con 100 L de agua en aplicación terrestre. Se sugiere emplear aditivos de aspersión, recomendados para este tipo de aplicaciones foliares.

DOSIS:

Cultivo	Dosis	Aplicaciones/Observaciones
Hortalizas (tomate, pepino, chile, berenjena, fresa)	2 – 3 L/ha	Aplicar por aspersión cada 12 días desde inicio de floración, continuando durante todo el ciclo. Se puede mezclar con agroquímicos.

Caña de azúcar (como madurante)	3 L/ha	Por aspersión en aplicación única, en los 25 a 45 días previos a la cosecha.
Vid	2 – 3 L/ha	Aplicar de una semana previa a la cosecha.
Papa (para vaciado)	2 – 3 L/ha	Aplicar de una a dos semanas previo a la quema o desvare.
Cebolla (para vaciado)	2 – 3 L/ha	Aplicar de una a tres semanas previo a cosecha.
Berries (para reserva en corona)	2 – 3 L/ha	Aplicar antes del rose.
Espárrago (para reserva en corona)	2 – 3 L/ha	Aplicar previo al agoste.

INCOMPATIBILIDAD

Siempre realice una prueba de incompatibilidad antes de mezclarlo.