

# 

## ¿Qué es?

FERTILIZANTE ORGÁNICO MINERAL

**Promotor de llenado y maduración de frutos**

## ¿Qué hace?

Aumenta el llenado y peso de los granos, tubérculos y frutos cosechados y promueve su maduración y coloración uniforme.

## ¿Cómo lo hace?

Los **Ácidos ECCA Carboxy®** de tipo alifáticos de **Carboxy® K** permiten el eficaz flujo del Potasio contenido en esta formulación y el de la planta, a través de las hojas y por tejidos de conducción hacia los sitios de demanda, provocando una rápida respuesta en calibre, color y maduración de frutos.

## BENEFICIOS:

- Aumenta el llenado y peso de los granos, tubérculos y frutos cosechados.
- Coloración uniforme de los frutos.
- Mayor uniformidad de las cosechas.
- Asegura su inversión.

## CARACTERÍSTICAS:

| <b>FÍSICAS</b>       |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Olor                 | Característico                           |
| Forma                | Líquido                                  |
| Color                | Café                                     |
| Inflamable           | No                                       |
| Corrosividad         | No se considera corrosivo                |
| <b>QUÍMICAS</b>      |                                          |
| pH al 10%            | 6.5 – 7.5                                |
| Densidad a 20 °C     | 1.13 - 1.17 g/cm <sup>3</sup>            |
| Punto de Ebullición  | 100.1 – 100.3 °C                         |
| compatibilidad       | No mezclar con agentes oxidantes fuertes |
| <b>GENERALES</b>     |                                          |
| Almacenamiento       | No exponer a temperaturas mayores a 80°C |
| Ambientales          | No residual, de muy bajo impacto         |
| Certificado Orgánico | No                                       |
| Toxicidad            | Ligeramente Tóxico                       |

## RECOMENDACIONES DE USO:

| Cultivo                                                             | Dosis                                     | Aplicaciones                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tomate, Pepino, Melón, Fresa, Sandía, Calabaza                      | 2 – 4 L/ha                                | En intervalos de 2 semanas en llenado de fruto                                                        |
| Melón                                                               | 1L/ha                                     | 40 y 50 días después del trasplante                                                                   |
| Papaya                                                              | 1L/ha                                     | A partir de la floración realizar aplicaciones mensuales hasta 15 días antes de finalizar la cosecha. |
| Guayaba                                                             | 1 L/ha                                    | Desde cuajamiento de fruto realizar 3 aplicaciones mensuales.                                         |
| Uva                                                                 | 1 L/ha                                    | 70, 80 y 90 días después de la floración                                                              |
| Cebolla, Ajo, Zanahoria y otros cultivos de raíz                    | 2 – 4 L/ha                                | En intervalos de 2 a 3 semanas durante la etapa de desarrollo                                         |
| Mango, Papaya, Banano, Cítricos, Aguacate, Piña, Ornamentales, Café | 3 – 4 L/ha                                | A intervalos d 3 a 4 semanas durante fructificación.                                                  |
| Papa                                                                | 100-150 cc/bomba de 20 L o 1 -15 l/tanque | 3 aplicaciones cada 20 días iniciando en floración.                                                   |
| Cultivos anuales: Frijol, Maíz, Sorgo, Algodón, Maní                | 1 – 3 L/ha                                | Durante fructificación                                                                                |
| Arroz                                                               | 1 l/ha cada aplicación                    | En la primera y segunda espiga.                                                                       |
| Crucíferas: Coliflor, Brócoli, Lechuga.                             | 2 – 4 L/ha                                | Al inicio de formación de cabeza y 2 semanas después.                                                 |

## COMPATIBILIDAD:

No debe mezclarse con productos oxidantes y álcalis.

### ANÁLISIS GARANTIZADO:

**Ácidos ECCA Carboxy®** expresados como Carbono Orgánico Oxidable Total  
Potasio (K<sub>2</sub>O)

g/l

**63,65**  
140,0

*\*Provenientes del proceso patentado **ECCA Carboxy®** con certificación orgánica.*

