

Producido por	FICHA TECNICA CIPERLAQ 20 EC	Fecha de elaboración: 27-May-2013	Importado y distribuido por  AgroProductiva S.A.
		Próxima revisión: May-2014	
		Página: 1 de 3	

DESCRIPCION - GENERALIDADES

CIPERLAQ 20 EC

Registro Nacional - ICA No. 1272

Insecticida de contacto e ingestión. Se caracteriza por el bloqueo del sistema nervioso, ejercido a través del contacto directo del producto sobre los insectos y la absorción de los residuos depositados sobre las plantas (hojas, tallos y frutos).

COMPOSICION

Ingrediente activo: Cipermetrina

Concentración: 200 g/litro

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Tipo de producto:	Insecticida agrícola
Grupo químico:	Piretroide
Nombre químico:	Cipermetrina (2,2-Diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropano-carboxilato de a-ciano-3-fenoxibencilo)
Fórmula empírica:	$C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$
Formulación:	Concentrado Emulsificable (EC)
Densidad:	0.930 g/ml a 25°C
Categoría Toxicológica:	II – Moderadamente Peligroso (Franja Amarilla) – Nocivo

PRESENTACIONES COMERCIALES

1 Litro	
4 Litros	
20 Litros	

**AGROPRODUCTIVA AVENIDA 4 NORTE No. 64N-74 LOCAL 8 – CENTRO DE NEGOCIOS 70 NORTE
TEL. 4850720 FAX. 4850718 – CALI, COLOMBIA**

Producido por 	FICHA TECNICA CIPERLAQ 20 EC	Fecha de elaboración: 27-May-2013	Importado y distribuido por 
		Próxima revisión: May-2014	
		Página: 2 de 3	

BENEFICIOS/ RECOMENDACIONES DE USO

CIPERLAQ 20 EC actúa en los insectos por contacto e ingestión, se recomienda para su aplicación al follaje en los siguientes cultivos:

Cultivo	Plaga	Dosis (ml/ha)	Observaciones
Papa	Tostón (<i>Liriomyza quadrata</i>)	500	
Algodonero (30)	Gusano bellotero (<i>Helicoverpa zea</i> , <i>Heliothis virescens</i>) Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>) Gusano rosado (<i>Pectinophora gossypiella</i>) Perforador de la hoja (<i>Bucculatrix thurberiella</i>) Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>) Gusano peludo (<i>Estigmene acrea</i>)	375-500	Use las dosis más altas para larvas de más de 1 cm de largo.
Soya (7)	Conchuela verde (<i>Nezara viridula</i>) Conchuela café (<i>Euschistus servus</i>) Gusano de la vaina (<i>Helicoverpa zea</i>) Gusano falso medidor (<i>Pseudoplusia includens</i>) Gusano peludo (<i>Estigmene acrea</i>)	400-500	Use las dosis altas para presiones fuertes de plaga.
Maíz (1)	Gusano trozador (<i>Agrotis ipsilon</i> , <i>Chorizagrotis auxiliaris</i>) Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	250	Dirigir las aplicaciones al cogollo de la planta. Aplique a la base del tallo muy temprano en la mañana o al atardecer.
Tabaco (SL)	Gusano del cuerno (<i>Manduca sexta</i>) Gusano de la yema (<i>Heliothis virescens</i>)	250	

Tiempo de reentrada a zonas tratadas: 24 horas.

() Intervalo de seguridad en días. SL = Sin Límite.

Producido por 	FICHA TECNICA CIPERLAQ 20 EC	Fecha de elaboración: 27-May-2013	Importado y distribuido por 
		Próxima revisión: May-2014	
		Página: 3 de 3	

PRECAUCIONES

Salud:

En la manipulación de CIPERLAQ 20 EC se deben tomar las precauciones necesarias para evitar cualquier riesgo de intoxicación. Después de estar en contacto con el producto y/o su envase deben lavarse las manos con abundante agua y jabón. No se debe fumar, comer o beber mientras se manipula. Ver hoja de seguridad.

Medio Ambiente:

Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos.

Compatibilidad:

CIPERLAQ 20 EC no es compatible con productos de naturaleza alcalina.