Dow AgroSciences

Cobrethane™

Etiqueta Web - Colombia

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTE ACTIVO:

MANCOZEB ..... **500 g/kg**
Producto de coordinación del ión zinc y el etilenbisditiocarbamato de manganeso, de formulación a 20°C.

Oxicloruro de Cobre ..... **190 g/kg**

Ferrocianuro Férrico ..... **50 g/kg**

INGREDIENTES ADITIVOS: ..... **c.s.p. 1 kg**

Registro de Venta ICA No. 1095

Titular del Registro: Dow AgroSciences de Colombia S.A.

FORMULADO POR:
Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Carrera 50 No. 13-209
Soledad, Atlántico (095) 3759300

DISTRIBUIDO POR:
Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Diagonal 92 # 17A -42 Piso 7º.
Bogotá (091) 2196000

® ™ **Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía afiliada de Dow**

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
MEDIANAMENTE TÓXICO
CUIDADO

Rev. Ago/2013

Dow AgroSciences

Cobrethane™

Etiqueta Web - Colombia

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cobrethane™ es un fungicida que reúne las propiedades fungicidas del Mancozeb (producto de coordinación iónica del Zinc y el etilenbisditiocarbamato de manganeso), las del Oxicloruro de Cobre y Complejo Férrico, completándose para dar un mejor control de las enfermedades fungosas en diferentes cultivos. Presenta una gran actividad fungicida inicial y una buena persistencia en la planta, prologando el control y ofreciendo propiedades de adherencia que le permiten resistir más el lavado de las lluvias.

El efecto fungicida del **Cobrethane™** es preventivo, por lo tanto es necesario aplicarlo al aparecer los primeros síntomas o cuando las condiciones del tiempo (humedad, rocío, lluvias) favorezcan el desarrollo de las enfermedades fungosas.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	RECOMENDACIONES	P.C.	P.R.
CAFÉ	**Mancha de hierro** *(Cercospora coffeicola)*	1.0 kg/ha ó 500 g/200 L de agua	En cultivo y almácigos, haga aplicaciones cada 10 a 15 días, según el ataque del hongo. La enfermedad se presenta con frecuencia en cultivos al sol o con poco sombrío.	0	12 horas
	Roya *(Hemileia vastatrix)*	2.0 kg/ha ó 1,0 kg/200 L de agua	Aplicar de forma preventiva para asegurar la protección del cultivo*.	0	12 horas
PAPA	**Gota** *(Phytophthora infestans)*	2.0-3.0 kg/ha ó 500 a 1000 g/200 L de agua	Repita las aplicaciones cada 7 a 15 días dependiendo de la intensidad de las lluvias.	14 días	24 horas
TOMATE	**Gota** *(Phytophthora infestans)* **Tizón temprano** (*Alternaria solani)*	2.0-3.0 kg/ha ó 500 a 1000 g/200 L de agua	Repita las aplicaciones cada 7 a 15 días dependiendo de la intensidad de las lluvias. En períodos muy lluviosos es necesario aplicar con el intervalo más corto. Para la aplicación, la bomba debe estar bien calibrada y con la boquilla y sus accesorios en perfectas condiciones para lograr una buena rociadura.	14 días	24 horas
CEBOLLA DE BULBO	**Mancha púrpura** *(Alternaria porri)*	2.0 kg/ha en un volumen de 400 L de agua/ha ó 1.0 kg/200 L de agua	Repita las aplicaciones cada 7-15 días dependiendo de la intensidad de las lluvias y la presión de la enfermedad.	7 días	24 horas

Dow AgroSciences

Cobrethane™

Etiqueta Web - Colombia

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	RECOMENDACIONES	P.C.	P.R.
ARROZ	**Complejo de Manchado de Grano**	2.0 kg/ha en un volumen de 100 L de agua/ha	Realizar dos aplicaciones: 1ª. Con 5-10% espigamiento. 2ª. Al completar espigamiento.	15 días	24 horas

P.C. Período de Carencia
P.R Período de reentrada

*En café se puede requerir otra aplicación según condiciones climáticas (humedad, rocío, lluvias).

COMPATIBILIDAD:

Si se van a realizar mezclas, se recomienda realizar previamente pruebas de compatibilidad en áreas pequeñas. No es compatible con aquellos que contengan cal o azufre.

FITOTOXICIDAD:

A las dosis y forma de aplicación recomendadas no causa fitotoxicidad.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este empaque corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Dow AgroSciences

Cobrethane™

Etiqueta Web - Colombia

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Nocivo si se ingiere.
Evite el contacto con los ojos, piel y ropa.
"No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación".
No contamine aguas potables, de riego o para uso doméstico.
"Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón".
No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, medicamentos para uso humano o animal, ropas, fertilizantes, semillas, insecticidas o herbicidas.
"Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas".
Conservar el producto en el empaque original etiquetado y cerrado.
En caso de derrame, absorba y recoja con aserrín o tierra seca e incinere en horno especificado para tal fin. (Ver teléfono de Emergencia Química).

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
"En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón".
INGESTIÓN: NO INDUZCA EL VÓMITO A MENOS QUE EL MÉDICO INDIQUE LO CONTRARIO.
INHALACIÓN: Lleve el paciente al aire fresco.
NOTA AL MÉDICO: No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS
01 8000 916012 Fuera de Bogotá.
En Bogotá comunicarse con el (091) 2886012

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Manténgalo lejos del fuego y de las chispas. Guárdelo en lugar seco y fresco. No permita que reciba mucho calor en el almacenamiento, ya que esto puede ocasionar cambios en la composición química, mermándose su efectividad y además, puede producir vapores inflamables. Manténgase el empaque bien cerrado. No lo almacene con comida o ninguna clase de alimentos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente. No utilice el mismo equipo de fumigación para aplicar **Cobrethane™** en la aplicación de otro plaguicida, en cultivos susceptibles o para bañar ganado.
Evite contaminar con **Cobrethane™** las aguas que vayan a ser utilizadas en consumo humano, animal o riego de cultivo. "Respete las franjas de seguridad mínimas de 10 metros para aplicación terrestre y de 100 metros para aplicación aérea distantes de los cuerpos o cursos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, cultivos susceptibles de daño por contaminación, o cualquier otra área que requiera protección".

ADVERTENCIA: "NINGÚN EMPAQUE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO".

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE EMPAQUE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Fecha aprobación ICA: 27 / 08 / 2012