Dow AgroSciences

Combatran™ SL

Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTE ACTIVO:

Picloram: Ácido 4-amino-3,5,6-tricloropicolínico, 80 g/l de formulación a 20°C, equivalente a 143,4 g/l en forma de sal triisopropanolamina de Picloram.

Ácido 2,4-D: Ácido 2,4-diclorofenoxiacético, 160 g/l de formulación a 20°C, equivalente a 298,5 g/l en forma de sal triisopropanolamina de 2,4-D.

INGREDIENTES ADITIVOS: **c.s.p. 1 litro**

Registro de Venta ICA No. 1519

Titular del Registro: Dow AgroSciences de Colombia S.A.

FABRICADO POR:
Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Transversal 18 # 96-41 Piso 7o.
Bogotá (091) 219 6000
Cartagena (095) 668 8000

® ™ **Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía afiliada de Dow**

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
MEDIANAMENTE TÓXICO
CUIDADO

Rev. Ago/2013

Dow AgroSciences

Combatran™ SL

Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE - SL

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Aplique **Combatran™ SL** en forma de aspersión mezclado con agua. **No se mezcle con aceite o ACPM.** Para obtener mejores resultados utilícelo cuando las malezas estén creciendo vigorosamente, después que las hojas se hayan desarrollado por completo, es decir, una vez establecido el período de lluvias o cuando exista suficiente humedad en el suelo. **Combatran™ SL** es un herbicida recomendado para el control de malezas herbáceas y arbustivas de hoja ancha que crecen en potreros.

CULTIVO	TRATAMIENTO	DOSIS	P.C.	P.R.
POTREROS	**GENERAL** (Áreas densamente pobladas) **LOCALIZADO** (Malezas en manchones o diseminadas)	4.0-8.0 l/h en un volumen de agua de 400 l/ha 0.25-1.0 l/ha en un volumen de agua de 100 l/ha	N.A.	24 horas
	Malezas Herbáceas Anuales Alcanforada *(Hyptis suaveolens)*, Bicho *(Cassia tora)*, Bledo *(Amaranthus* spp.), Cafecillo *(Cassia occidentalis)*, Clavo de agua *(Jussiaea linnifolia)*, Cotorrera *(Julocroton argenteus)*, Dormidera *(Mimosa pudica)*, Pata de Tórtola *(Croton hirtus)*, Rabo de Alacrán *(Heliotropium indicum)*.	0.25%-0.5%	N.A.	24 horas
	Malezas Semileñosas y Leñosas Escoba blanca *(Melochia perviflora)*, Flor amarilla *(Melampodium* sp.), Lulo de Perro *(Solanum* sp.), Malva *(Malachra alceifolia)*, Matacaballo *(Asclepias curassavica)*, Pega pega *(Desmodium tortuosum)*, Pica pica *(Macuna pruriens)*, Rosa Vieja *(Eupatorium vitalbae)*, Verbena *(Stachytarpheta cayennensis)*	0.5% - 1.0%	N.A.	24 horas
	Malezas Leñosas Bocachica *(Thalia geniculata)*, Escoba Dura *(Sida* spp.), Espino *(Pithecolobium lanceolatum)**, Mosquero *(Croton leptostachyus)*, Pata de Vaca *(Bauhinia divaricata)**, Uña de Gato *(Batocydia unguis)*, Zarza *(Mimosa pigra)**	1.0%	N.A.	24 horas
	Toconeo	4.0% en un volumen de agua de 100 l/ha	N.A.	24 horas

P.C. Período de Carencia
P.R. Período de reentrada
* Utilice el sistema de Toconeo cuando la maleza venga de rebrote.

Dow AgroSciences

Combatran™ SL

Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE - SL

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
El herbicida deberá aplicarse cada vez que las condiciones climáticas y ambientales sean propicias para el desarrollo de malezas.

NOTA: En aplicaciones foliares, utilice las dosis más bajas del rango para malezas en estado temprano de crecimiento y las dosis más altas para malezas en estado avanzado de crecimiento.
Se recomienda sacar el ganado del potrero antes de aplicar **Combatran™ SL** y reintroducirlo después de 24 horas de tratado. Para malezas leñosas con troncos y cepas resistentes, corte el tronco o haga heridas superpuestas. Aplique con brocha o bomba de espalda sobre el corte fresco hasta lograr escurrimiento. Este tratamiento puede efectuarse en época de lluvia o sequía.

COMPATIBILIDAD Y TOXICIDAD:
Los herbicidas hormonales son compatibles con la mayoría de herbicidas e insecticidas que se encuentran en el mercado.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Dow AgroSciences

Combatran™ SL

Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE - SL

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Nocivo si se ingiere.

Evite el contacto con los ojos, piel y ropa.

"No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación".

No contamine aguas potables, de riego o para uso doméstico.

"Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón".

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, medicamentos para uso humano o animal, ropas, fertilizantes, semillas, insecticidas o fungicidas.

"Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas".

Evite que la mezcla caiga o sea acarreada por el viento sobre hortalizas, vides, flores, frutales, ornamentales, algodoneros, fríjol, papa, tabaco, yuca, plátano y otras plantas útiles sensibles al 2,4-D o Picloram. Pequeñas cantidades pueden causarles daños severos. Absténgase de realizar aplicaciones aéreas en las inmediaciones de estos cultivos.

Líquido combustible. Manténgase alejado del calor y del fuego.

Conservar el producto en el empaque original etiquetado y cerrado.

En caso de derrame, absorba y recoja con aserrín o tierra seca e incinere en horno especificado para tal fin. (Ver teléfono de Emergencia Química).

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

"En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón"

INGESTIÓN: NO INDUZCA EL VÓMITO A MENOS QUE EL MÉDICO INDIQUE LO CONTRARIO.

INHALACIÓN: Lleve el paciente al aire fresco.

NOTA AL MÉDICO: No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS

01 8000 916012 Fuera de Bogotá.

En Bogotá comunicarse con el (091) 2886012

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente. No utilice el mismo equipo de fumigación para aplicar **Combatran™ SL** en la aplicación de otro plaguicida, en cultivos susceptibles o para bañar ganado.

Evite contaminar con **Combatran™ SL** las aguas que vayan a ser utilizadas en consumo humano, animal o riego de cultivo.

Tenga en cuenta la franja de seguridad y la regulación dada por el ICA.

ADVERTENCIA: "NINGÚN EMPAQUE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO".

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE EMPAQUE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Fecha aprobación ICA: 11 / 09 / 2006