



Dow AgroSciences

ComboTM

Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE - SL + GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Concentrado soluble en agua:

INGREDIENTES ACTIVOS:

Picloram: 240 g/l
4-amino-3,5,6-trichloropicolinic en forma ácida. Equivalente a 278 g/l en forma de sal potásica de formulación a 20°C.

INGREDIENTES ADITIVOS: c.s.p. 1 litro

Gránulos dispersables en agua:

INGREDIENTE ACTIVO:

Metsulfuron metil: 600 g/Kg
methyl 2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoysulfamoyl) benzoate

INGREDIENTES ADITIVOS: c.s.p. 1 Kg

Registro de Venta ICA No. 1867
Titular del Registro: Dow AgroSciences de Colombia S.A.

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:

Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Transversal 18 No. 96-41 Piso 7°.
Bogotá (091) 2196000 - Cartagena (095) 6688000

® TM Marca de The Dow Chemical Company
("Dow") o una compañía afiliada de Dow

(1) Producto de Dupont

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA IV
LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN**



Dow AgroSciences

Combo™

Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE - SL + GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”


Combo™ es un herbicida selectivo y sistémico recomendado para controlar malezas de hoja ancha leñosas, semileñosas y herbáceas que crecen en potreros y para el control de malezas de hoja ancha en el cultivo de arroz.

INSTRUCCIONES PARA SU USO

Aplice **Combo™** en forma de aspersión mezclado con agua, no se mezcle con aceite o ACPM, cuando las malezas están en activo crecimiento (entre 40 y 100 cms.) o antes de floración. Estas condiciones se presentan una vez establecido el período de lluvias o cuando exista suficiente humedad en el suelo.

Para preparar la mezcla de **Combo™** disuelva los gránulos en el líquido agitando vigorosamente el envase durante 15 segundos o hasta obtener una mezcla uniforme. Vierta la cantidad recomendada para su aplicación en la mitad del agua requerida y agite bien. Luego adicione el agua restante agitando. Proceda inmediatamente a su aplicación. Agite siempre la mezcla antes de llenar el equipo de aspersión.

La elección de la dosis está basada en la especie de la maleza a tratar, su tamaño y consistencia. Preferiblemente debe aplicarse a malezas tiernas en plena actividad de crecimiento.





Dow AgroSciences

ComboTM**Etiqueta Web - Colombia****HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE - SL + GRÁNULOS DISPERSABLES - WG**

CULTIVO	TRATAMIENTO	DOSIS ENVASES Combo TM	P.C	P.R.
POTREROS	GENERAL (Áreas densamente pobladas)		N.A.	24 horas
	Malezas de consistencia herbácea	2 envases en un volumen de agua de 400 l/ha.		
	Malezas leñosas	4 envases en un volumen de agua de 400 l/ha.		

Calibre bien su equipo de aspersión antes de hacer la aplicación del herbicida. Se recomienda trabajar el equipo disponible a una presión de descarga baja, cercana a 30 p.s.i..

POTREROS	LOCALIZADO (Áreas con malezas diseminadas en manchones)		N.A.	24 horas
	Malezas de consistencia herbácea	1 envase en un volumen de agua de 200 l/ha.		
	Malezas leñosas	2 envases en un volumen de agua de 200 l/ha.		

Utilice equipos de aplicación de espalda, bestia o estacionario. Humedezca bien el follaje de la maleza.

CULTIVO	TRATAMIENTO	DOSIS ENVASES Combo TM	P.C	P.R.
POTREROS	BOMBA DE ESPALDA (5 GALONES)		N.A.	24 horas
	Malezas de consistencia herbácea	1/2 medida (*) en un volumen de agua de 20 l/ha.		
	Malezas leñosas	1 medida (*) en un volumen de agua de 20 l/ha.		

(*) Utilice las medidas indicadas dentro de la tapa dosificadora del envase. (Raya de abajo = 1/2 medida, Raya de arriba = 1 medida)

CULTIVO	TRATAMIENTO	DOSIS ENVASES Combo TM	P.C	P.R.
ARROZ	La dosis de 0.5 unidades debe ser utilizada en lotes con población moderada y con 4-6 hojas de desarrollo. La dosis de 0.75 unidades debe ser utilizada en lotes con alta población de malezas con más de 6 hojas de desarrollo.	0.5 - 0.75 unidades/ha en un volumen de agua de 100-200 l/ha	N.A.	24 horas

P.C. Período de Carencia

P.R. Período de reentrada

NOTA: Se recomienda sacar el ganado del potrero antes de aplicar **ComboTM** y reintroducirlo después de 24 horas de tratado.





Dow AgroSciences

ComboTM

Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE - SL + GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

MALEZAS QUE CONTROLA EN POTREROS:

Malezas de Consistencia Herbácea (DOSIS BAJA):

Alcanforada (*Hyptis suaveolens*), Bicho (*Senna obtusifolia*), Bledo (*Amaranthus* sp.), Cafecillo (*Cassia occidentalis*), Dormidera (*Mimosa pudica*), Pata de tórtola (*Croton hirtus*), Rabo de Alacrán (*Heliotropium indicum*).

Malezas de Consistencia Leñosa (DOSIS ALTA):

Bálsamo chaparro (*Mirospermum frutescens*), Bocachica (*Thalia geniculata*), Escoba blanca (*Melochia parviflora*), Escoba dura (*Sida acuta*), Espino (*Pithecolobium lanceolatum*), Helecho (*Pteridium aquilinum*), Malva (*Malachra alceifolia*), Mortiño (*Clidemia rubra*, *Clidemia capitellata*), Mosquero (*Croton leptostachyus*), Pata de vaca (*Bauhinia divaricata*), Pega Pega (*Desmodium* sp.), Zarza (*Mimosa pigra*), Soldado parado (*Chelonanthus* sp.).

MALEZAS QUE CONTROLA EN ARROZ:

Botón blanco (*Eclipta alba*), Verdolaga (*Portulaca olerace*) y Palo de agua (*Ludwigia linifolia*).

COMPATIBILIDAD:

ComboTM no debe ser mezclado con otros herbicidas y tampoco con ACPM.

FITOTOXICIDAD:

ComboTM es fitotóxico a todos los vegetales de hoja ancha por lo que se debe evitar que entre en contacto con cultivos y plantas deseables susceptibles a los ingredientes activos de **ComboTM**.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.





Dow AgroSciences

ComboTM

Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE - SL + GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**MANTÉNGASE BAJO LLAVE,
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

Nocivo si se ingiere.

Evite el contacto con los ojos, piel y ropa.

No contamine aguas potables, de riego o para uso doméstico.

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, drogas para uso humano o animal, ropas, fertilizantes, semillas, insecticidas o fungicidas.

Evite que la mezcla caiga o sea acarreada por el viento sobre hortalizas, flores, frutales, algodóneros, tabaco, yuca y otras plantas útiles sensibles al Picloram o al Metsulfuron-Metil(1). Absténgase de realizar aplicaciones aéreas en las inmediaciones de estos cultivos.

Líquido combustible. Manténgase alejado del calor y del fuego. Consérvese bien tapado.

En caso de derrame, absorba y recoja con aserrín o tierra seca y entierre en sitio autorizado por la entidad de salud local. (ver teléfono de Emergencia Química).

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”

INGESTIÓN: NO INDUZCA EL VÓMITO A MENOS QUE EL MÉDICO INDIQUE LO CONTRARIO.

INHALACIÓN: Lleve el paciente al aire fresco.

NOTA AL MÉDICO: No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS
01 8000 916012 Fuera de Bogotá.

En Bogotá comunicarse con el (091) 2886012

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente. No utilice el mismo equipo de fumigación para aplicar **ComboTM** en la aplicación de otro plaguicida, en cultivos susceptibles o para bañar ganado.

Evite contaminar con **ComboTM** las aguas que vayan a ser utilizadas en consumo humano, animal o riego de cultivo.

Tenga en cuenta la franja de seguridad y la regulación dada por el ICA.

ADVERTENCIA: “NINGÚN EMPAQUE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.

**DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO,
ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE
Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA
MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO
INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O
PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO
EN EL LUGAR DESTINADO
POR LAS AUTORIDADES
LOCALES PARA ESTE FIN.**

Fecha aprobación ICA: 02 / 12 / 2009

