

CONFIDOR® SC 350



- Suspensión concentrada - SC
- Neonicotinide
- Insecticida Agrícola
- Reg. de venta ICA 2500
- Titular del Registro Bayer S. A.

Composición garantizada:

Ingrediente activo:

Imidacloprid:(E) - 1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin -2- ylideneamine 350 g de formulación a 20 °C.

Ingredientes aditivos:.....c.s. p 1 litro

Precauciones y advertencias para el usuario:

CONFIDOR® SC 350 es un insecticida medianamente tóxico, se recomienda observar todas las precauciones necesarias en el manejo y la aplicación de plaguicidas.

Precauciones generales de uso

AMBIENTE:

- No contamine fuentes de agua.
- Tóxico para abejas: No aplicar en presencia de abejas o polinizadores o cerca de enjambres. Aplicar temprano en la mañana o al final de la tarde. Si existen apiarios cercanos informe previamente al agricultor.
- Respetar las franjas de seguridad en relación a los cuerpos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal o cualquiera otra aérea que requiera protección especial 10 metros (terres- tre) 100 metros (aérea)

Ver: PRECAUCIONES GENERALES PARA EL AMBIENTE

Almacenamiento:

- Este producto no es inflamable.

Ver: NORMAS DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DERRAMES

- En caso de derrame o incendio llamar a: CISPROQUIM. Teléfonos 2886012 en Bogotá. Fuera de Bogotá, línea 018000-916012.
- Línea Bayer CropScience de servicio al cliente 01 8000 111212.

Primeros auxilios:

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión induzca el vómito si el paciente está consciente.
- Mientras consigue asistencia médica, suministre al paciente los PRIMEROS AUXILIOS: generales.

Guía para el médico: Aplique tratamiento sintomático.

Bayer CropScience una división de Bayer S. A.
Línea 01 8000 111 212
Bogotá, D.C., Colombia
® Marca Registrada

Instrucciones de uso, manejo:

- Consulte un ingeniero agrónomo
- Agítelo antes de usar y destapar el producto
- **CONFIDOR® SC 350** es un insecticida con acción de contacto y estomacal que actúa sobre el sistema nervioso central.

Cultivo	Plaga	Dosis ml/ha	1P.C.	2P.R.
Algodón	Pulgones de algodón <i>Aphis gossypii</i>	0.2 - 0.3 L p.c. /ha.	14 Días	4 Horas
Flores de corte (rosas y crisantemo)	Áfidos, Pulgones <i>Macrosiphoniella sanborni</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Mizus persicae</i>	0.25 - 0.3 L p.c. /ha.	N.A.	
Arroz	<i>Tagosodes orizicolus</i> (Transmisor del VHB)	0.100 a 0.150 L/ha. Iniciar aplicaciones en estados tempranos del arroz, con las primeras infestaciones de la plaga.	22 Días	
Tomate	Mosca blanca <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Realizar la siguiente secuencia de aplicación: • Aplicar en semillero con regadera a los 8-12 días antes del trasplante, utilizando 1 mL de CONFIDOR® SC 350/litro de agua por m ² de semillero. • Aplicación en forma de protección planta por planta o "drench" a los 10-12 días después del trasplante en dosis de 0.6-0.8 litros de CONFIDOR® SC 350/ha, utilizando altos volúmenes de agua (800-1.000 L/ha) • Aspersión foliar de acuerdo con el nivel de infestación (previo monitoreo de la plaga) en dosis de 0.6 a 0.8 litros de CONFIDOR® SC 350/ha. • Posteriormente se recomienda utilizar otro grupo Químico si es necesario.	7 Días	
Tabaco		14 Días		
Pastos*	El Chinche de los pastos <i>Collaria scenica</i>	Aplicar 150 cm ³ de p.c./ha 15-20 días después del pastoreo (aparición de los primeros instares ninfales).	21*	
Maíz	Chicharritas <i>Dalbulus maidis</i> (Vector del acaparamiento)	Aplicar 100 cm ³ de p.c./ha en los primeros estados de desarrollo del cultivo y con las primeras infestaciones.	22 Días	

NA. No aplica

PC: periodo de carencia

PR: Periodo de re-entrada: periodo restringido (no prohibido) entre la aplicación y la re-entrada del personal al área aplicada (ver tiempo en cuadro) siempre verifique que la superficie foliar este seca. Si requiere realizar alguna labor antes de cumplirse el periodo de re-ingreso (ej monitoreo de la aplicación) debe utilizar overol, guantes y botas.

* Periodo entre la última aplicación y el reingreso del ganado: 21 días.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:**

Pastos. En lotes con antecedentes de infestaciones generalizadas de la plaga seguir las recomendaciones del producto como alternativa de control químico dentro de un programa de Manejo Integrado de Plagas. En lotes sin antecedentes del insecto se recomienda realizar monitoreo de la población (ninfas y adultos) para tomar la decisión de aplicar por focos o generalizada (0,75 cm³/litro agua para una calibración de 200 L/ha).

Ver: INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD.

PRESENTACIONES: 100 y 500 cm³.

Categoría toxicológica: III MEDIANAMENTE TÓXICO