

# Connect® DUO

Registro Nacional ICA 1199

Dispersión Oleosa – OD  
Neonicotinoide + Piretroide  
Titular del registro Bayer S.A.

Composición garantizada:

Ingredientes activos:

Imidacloprid.....210 g/litro de formulación a 20°C

Beta-cyfluthrin.....90 g/litro de formulación a 20°C

ingredientes aditivos..... c.s.p. 1 litro

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. UTILIZAR GUANTES PARA LAS  
ACTIVIDADES DE MANEJO, APLICACIÓN Y REENTRADA. AGITELo ANTES DE DESTAPAR Y USAR EL  
PRODUCTO**

**Precauciones y Advertencias de uso: Y APLICACIÓN:**

**PELIGROSO SI ES INHALADO. EVITE RESPIRAR ASPERSIÓN. EL CONTACTO PROLONGADO O REPETIDO PUEDE CAUSAR REACCIONES ALÉRGICAS EN CIERTAS PERSONAS.**

- Utilizar ropa de protección adecuada al manipular, aplicar el producto; y para ingresar al área tratada antes de terminar el periodo de re-entrada (12 horas).
- **No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.**
- **Después de aplicar el producto báñese con abundante agua y jabón, lave la ropa contaminada.**
- Verificar el buen estado del equipo de aplicación y calíbrelo previamente.
- No sople con la boca las boquillas obstruidas; utilice un cepillo para destaparlas.
- Lave el equipo en el sitio de la aplicación y deseche esta agua en el área tratada.
- No permita amíñales en el área tratada.
- **Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No re-envase el producto**
- No almacenar en casas de habitación. Almacene el producto en sitio seguros, retirados de alimentos y medicinas de consumo humano y animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco, seco y ventilado).
- Transpórtelo solamente con productos agroquímicos; NO con productos de consumo humano y animal.

## **INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

**En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta adjunta.**

En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua por mínimo 15 minutos, cubra el ojo afectado y lleve al paciente al médico

En caso de contacto con la piel, retire la ropa y bañe al paciente con abundante agua y jabón y lleve al médico

En caso de intoxicación por inhalación, retire la víctima de la zona de contaminación, lleve al aire libre y mantenga al paciente acostado de medio lado y vigile que éste respire.

## **GUIA PARA MEDICO**

- Medidas de descontaminación general; si ha ingerido, practicar lavado gástrico, terminando con carbón activado y sulfato sódico.
- No hay un antídoto específico; por lo tanto cualquier tratamiento debe ser sintomático
- Mantener libres las vías respiratorias
- Si hay convulsiones usar Diazepam IV, contar con asistencia respiratoria
- Si hay ardor y comenzón en piel, aplicar una mezcla de 50% de crema con vitamina E y 50% de Xilocaina
- Contraindicaciones: altas dosis de atropina, compuestos adrenérgicos (ej. Adrenalina, epinefrina), excepto si se requiere RCP.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

**Bayer CropScience una división de Bayer S. A.**  
**Línea 01 8000 111 212**  
**Bogotá, D.C., Colombia**  
**® Marca Registrada**

- En caso de derrame, recoger con materiales absorbentes (aserrín o tierra seca), guardarlo en bolsa plástica y/o caneca y deseche acorde con la entidad local competente
- No asperjar áreas fuera del cultivo a tratar. Lave el equipo en el sitio de la aplicación y deseche esta agua en el área tratada.
- Tóxico para peces. NO contaminar lagos, ríos, estanques ni arroyos, con desechos o envases vacíos.
- Respetar las franjas de seguridad en relación a cuerpos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal o cualquier otra área que requiera protección especial, 10 metros (terrestre).
- Tóxico a aves
- Altamente tóxico a abejas. No aplicar en presencia de abejas o polinizadores o cerca de enjambres. Preferible aplicar temprano en la mañana o al final de la tarde. **Aplicar únicamente durante el periodo vegetativo del cultivo.** No se recomienda aplicaciones aéreas en cultivos que tengan o estén rodeados de fuentes atractivas a abejas.

SE PROHIBE LA UTILIZACIÓN DEL ENVASE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO. DESPUES DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES EL ENVASE Y VIERTA LA SOLUCION EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN, EVITANDO SALPICADURAS. LUEGO INUTILICELO TRITURANDOLO O PERFORANDOLO Y DEPOSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, DERRAME O INCENDIO COMUNICARSE CON CISPROQUIM: Línea 01 8000 916012 atención 24 HORAS. O EN BOGOTÁ AL Tel.: (091) 2 88 60 12. LÍNEA BAYER CROPSCIENCE DE SERVICIO AL CLIENTE: 01 8000 111212.

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Cultivo	Plaga	Dosis Época	1P.C	2P.R.
Papa	Gusano Blanco <i>Premnotrypes vorax</i>	0.45 L/ha 150 mL por caneca de 200 litros. Aplicar en desyerba y aporque	21 días	12 horas
Cebolla Cabezona	Thrips <i>Thrips tabaci</i>	0.45 – 0.5 L/ha 0.45 L/ha, baja infestación, poblaciones hasta 5 individuos por planta. 0.5 L/ha, alta infestación, poblaciones mayores a 5 individuos por planta	7 días	
Cebolla Larga				
Cebolla Puerro				
Cebollín				
Frijol	Trips <i>Thrips palmi</i>	0.45 L/ha Aplicar con la aparición de los primeros individuos (menos de 5 individuos por planta) o síntomas de daño causados por la plaga	21 días	

P.C. Periodo de carencia: Tiempo entre la aplicación y la cosecha

P.R. Periodo de re-entrada: 12 horas, periodo restringido (no prohibido) entre la aplicación y la re-entrada del personal del área aplicada. Si requiere realizar alguna labor de monitoreo de la aplicación antes de cumplirse el periodo de re-ingreso, debe utilizar overol, botas y guantes.

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:** Connect DUO debe ser aplicado de acuerdo al monitoreo de la plaga, susceptibilidad de la variedad y condiciones ambientales, dentro de un programa de rotación con otros insecticidas de diferente mecanismo de acción y complementando con prácticas de manejo integrado de cultivo.

Categoría toxicológica II: Moderadamente peligroso

Bayer CropScience una división de Bayer S. A.  
Línea 01 8000 111 212  
Bogotá, D.C., Colombia  
® Marca Registrada