

CRECIFOL® 10-30-10



Concentrado soluble

Fertilizante compuesto complejo NPK para aplicación foliar

Uso agrícola

Registro de Venta ICA No. 140

A NOMBRE DE SODIAK S. A.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Nitrógeno Total (N) 100.00 g/L

Nitrógeno Amoniacal (N) 37.90 g/L

Nitrógeno Uréico (N) 62.10 g/L

Fósforo Asimilable (R205) 300.00 g/L

Potasio Soluble en agua (K20) 100.00 g/L

Calcio (CaO)* 0.21 g/L

Magnesio (MgO)* 0.24 g/L

Azufre Total (S) 1.17 g/L

Boro (B) 0.15 g/L

Cobalto (Co)* 0.03 g/L

Cobre (Cu)* 0.15 g/L

Hierro (Fe)* 0.65 g/L

Manganeso (Mn)* 0.01 g/L

Zinc (Zn)* 0.65 g/L

*Como Quelatos a base de EDTA

pH en solución al 10% 7.25

Densidad a 20oC 1.35 g/L

CRECIFOL® Fertilizante foliar líquido con elementos mayores NITROGENO, FOSFORO y POTASIO, diez (10) elementos menores y un adherente especial. Se recomienda para ser aplicado durante las etapas de desarrollo, floración y fructificación de las plantas. Ayuda a impedir la caída de las flores, la mala formación y la caída de los frutos, corrige los defectos de una excesiva fertilización de nitrógeno que podría inhibir la iniciación de la fase de floración normal. En general CRECIFOL® se recomienda en todos aquellos casos en que se requiere la aplicación de fertilizantes completos.

Cultivo	Dosis	Época
Papa	Aplique medio litro (500 cc) por caneca de 200 litros de agua o 50 cc por bomba de 20 litros.	Haga 2 a 3 aplicaciones entre crecimiento y floración
Tomate	Aplique medio litro (500 cc) por caneca de 200 litros de agua o 50 cc por bomba de 20 litros.	Haga 3 aplicaciones así: Semillero, crecimiento y floración.
Arroz	Aplique 2 a 3 litros por hectárea	Haga 2 a 3 aplicaciones, al inicio del macollamiento, embuchamiento y floración.
Algodón	Aplique 2 a 3 litros por hectárea.	Haga 2 a 3 aplicaciones al inicio de la floración y a la floración completa.
Frijol y Soya	Aplique medio litro (500 cc) por caneca de 200 litros de agua o 50 cc por bomba de 20 litros.	Antes de la floración, a la floración y al comenzar la formación del grano.
Maíz y Sorgo	Aplique 2 a 3 litros por hectárea.	Antes de la floración, a la floración y al comenzar la formación del grano.
Café	Aplique 2 a 3 litros por hectárea.	Haga 2 aplicaciones entre crecimiento y floración.
Cebada y Trigo	Aplique 2 a 3 litros por hectárea.	Antes de la floración, a la floración y al comenzar la formación del grano.
Cebolla	Aplique 2 a 3 litros por hectárea.	Haga 3 aplicaciones entre Semillero y Desarrollo completo.
Vid	Aplique medio litro (500 cc) por caneca de 200 litros de agua o 50 cc por bomba de 20 litros.	Haga 3 aplicaciones así: Semillero, Crecimiento y Floración.
Cítricos y Mango	Aplique medio litro (500 cc) por caneca de 200 litros de agua o 50 cc por bomba de 20 litros.	Haga 3 aplicaciones antes, al inicio de la floración y la floración completa.
Rosa y Clavel	Aplique medio litro (500 cc) por caneca de 200 litros de agua o 50 cc por bomba de 20 litros.	Haga 2 a 3 aplicaciones por temporada entre poda y el inicio de la floración.

MANEJO DEL PRODUCTO: No transporte este producto con productos alimenticios, forrajes, medicamentos, ropa o utensilios de uso doméstico. Almacene bajo llave en un sitio fresco, seco y aireado alejado del calor y aparte de herbicidas. Conserve el producto en su envase y cerrado herméticamente.

Importado y Distribuido por:

SODIAK S. A.

Km 1.5 vía Siberia Parque Agroindustrial de Occidente

Cota, Cundinamarca

Teléfono (57-1) 864 3232 www.sodiak.com.co - servicioalcliente@sodiak.com.co