Fungicida agrícola marca Curzate® M-8

Nombre de Producto: Curzate® M-8.
Ingrediente Activo: Cimoxanil y Mancozeb.
Tipo de Plaguicida: Fungicida Agrícola.
Formulación: Polvo Mojable (WP).
Número de Registro: 1445.
Categoría Toxicológica: III, Medianamente Tóxico, Cuidado (banda azul).

Composición Porcentual:

Ingrediente Activo Cimoxanil 1-(2-ciano-2-metoxiiminoacetil)--3-etilurea Mancozeb Producto de coordinazión de ion zinc con el etilenodisditiocarbamato.	80 g/Kg 640 g/Kg
Ingredientes Aditivos e Inertes	c.s.p. 1 kilogramo

Método de Preparación Y Aplicación del Producto

Método de Aplicación: Por aspersión foliar.

Equipo de Aplicación y su calibración:

Disuelva completamente la cantidad a usar del producto en un balde y luego deposítela en el tanque de mezcla que contenga agua hasta 1/4 o la mitad de su capacidad; complete el volumen de agua y agite gasta que la mezcla sea homogénea. Agite la mezcla de vez en cuando y cada vez que vaya a tener el equipo de apliación previamente calibrado. Mantenga

limpio y en buenas condiciones el equipo utilizado para la aplicación, cuidando que no se produzcan escapes ni contaminación externa.

Manejo de Resistencia:

Cuando se usan repetidamente fungicidas del mismo modo deacción durante varios años para controlar los mismos patógenos en un mismo campo, razas tolerantes de ocurrencia natural pueden sobrevivir, propagándose y llegando a ser dominantes en esa área. Un patógeno se considera tolerante a un fungicida cuando, en condiciones climáticas normales, sobrevive a una correcta aplicación del producto, usado en la dosis y época de aplicación recomendados. El desarrollo de razas tolerantes puede ser evitado o retardado, usando mezclas de productos y/o alternando productos de diferente modo de acción y de equivalente poder de control.

Recomendaciones de Uso

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Papa	Gota (*Phytophtora infestans*)	2 Kg/ha o 500 g/200 litros de agua o 50 g/bomba de 20 litros	Cada 7 a 14 días
Tomate	Gota (*Phytophtora infestans*) Tizón temprano (*Alternaria solani*)	2 Kg/ha o 500 g/200 litros de agua o 50 g/bomba de 20 litros	Cada 3 a 7 días, dependiendo del grado de infección.
Vid	Mildeo velloso (*Plasmopara viticola*) Polvullo (*Uncinula necator*)	2 Kg/ha o 1000 g/200 litros de agua o 5 g/bomba de litro (2)	Cada 3 a 7 días, dependiendo del grado de infección, aplicado en forma alterna con Mancozeb.
Cebolla	Mildeo velloso (*Peronospora destructor*)	1,5 Kg/ha	(1)

Nota: No hay restricción sobre el periodo de carencia (días entre la última aplicación y la cosecha.

(1) Aplique la dosis recomendada cada 15 días en cultivos sembrados en surco, a partir de plantas con 5 hojas activas y una densidad de siembra de 370000 plantas/ha. En cultivos con mayores densidad de siembra y/o tamaño de plantas ajuste la dosus mencionada. No se recomienda usar intervalos de aplicación mayores a 30 días. El intervalo entre aplicaciones depende de las condiciones climáticas, presión del patógeno, variedad y estado del cultivo. (2) Cuando se utilizan 400 l/ha.

P.R.: Periodo de Reingreso: No reingrese al área tratada antes de 12 horas.

Incompatibilidad Química

El Curzate® M-8 es compatible con los plaguicidas que son compatibles con Macozeb. Si el producto compañero de la mezcla aumenta el pH del agua por encima de 8.5, entonces la fracción correspondiente al cymoxanil sufre degradación. En el caso de que se desconozca la compatibilidad hay necesidad de hacer una prueba previa a su uso. Los siguientes productos son físicamente compatibles con Curzate® M-8: Benomil, Metomil, Oxamyl.

Fitotixicidad:

El Curzate® M-8 ha mostrado seguridad en los cultivos registrados, no causando síntoma de fitotoxicidad, ni reducción en los rendimientos.

Efectos sobre otros cultivos: No se han observado efectos aplicando en las dosis y forma recomendadas.

Efecto sobre cultivos sucesivos: Los 2 ingredientes activos que componen Curzate® M-8 se degradan rápida y completamente en el suelo para formar productos naturales, por lo tanto, la aplicación del producto no causa efectos negativos sobre los cultivos sucesivos.

Variedades susceptibles: No se han observado efectos aplicando en la dosis y forma r