

DERRIVON[®]

Metrifonato 97%

Polvo Soluble Ecto-endoparasitícida

Uso veterinario

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Cada 1000 g de DERRIVON POLVO contienen:

Metrifonato 970 g

Excipientes c.s.p. 1000 g

INDICACIONES:

En bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y aves para el control de parasitismo externo mediante baño y para el control del parasitismo interno administrado por la vía oral. Bovinos, ovinos, caprinos: Nuche, ácaros de la sarna, piojos y moscas. *Bunostomum* sp., *Haemonchus* sp., *Oesophagostomum* sp., *Ostertagia* sp., *Cooperia* sp., *Trichostrongylus* sp. En ovinos además controla el *Oestrus ovis*. Porcinos: Piojos, moscas, ácaros de la sarna, pulgas. Controla parásitos gastrointestinales, nuches, ácaros, piojos, *Oestrus ovis* y moscas. Otras indicaciones a criterio del médico veterinario.

ESPECIES PARA LAS CUALES ES RECOMENDADO:

Bovinos, equinos, porcinos, ovinos caprinos y aves.

TIEMPO DE RETIRO:

LOS ANIMALES TRATADOS NO DEBEN SACRIFICARSE PARA EL CONSUMO HUMANO HASTA 14 DÍAS DESPUÉS DE FINALIZADO EL TRATAMIENTO. LA LECHE PRODUCIDA DURANTE EL TRATAMIENTO Y 12 HORAS DESPUÉS DE FINALIZADO EL MISMO NO DEBE DARSE AL CONSUMO HUMANO.

DOSIS VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Parásitos gastrointestinales:

Diluir en 50 mL de agua 5 gramos de DERRIVON (solución en agua al 10%) y administrar por vía oral 1 mL de la solución al 10% por cada 2 Kg de peso vivo mediante botella, jeringa o pistola dosificada.

Nuches: Aplicar vía externa.

Diluir en 1/2 litro de agua 5 gramos de DERRIVON (solución en agua al 1%) y lavar totalmente el cuerpo del animal así: animal pequeño con medio litro de la solución: animal mediano con un litro y animal grande con 1 1/2 litros. Ácaros, piojos y moscas:

Aplicar vía externa. Diluir en 1 litro de agua 5 g de DERRIVON (solución en agua al 0.5%) y lavar totalmente el animal como también instalaciones y todo lugar o implementos donde se puedan alojar los parásitos.

MODO DE EMPLEO:

En la sal como ENDOPARASITICIDA. Mezcle 1 kg de DERRIVON en 5 kg de sal. (En Bovinos, ovinos y caprinos). En la práctica por cada 100 Kg de peso vivo administrar 10 g. de la mezcla.

Adminístrese en saladero durante 2-3 días continuos. Solución al 10% como ENDOPARASITARIA. Disuelva 1 Kg de DERRIVON en 10 L de agua y adminístrese 50 ml de la solución por cada 100 kg de peso.

Vía oral, (bovinos, porcinos y ovinos), en Equinos 3.5 mL/ 100 kg de peso.

Como ECTOPARASITICIDA:

DOSIS	EQUIVALE	INDICACIONES
Solución al 1 % Bovinos - Equinos	1 kg/100 L de agua 250g/25 L de agua 50g/5 L de agua 15g/1.5 L de agua	Dermatobia hominis Nuche Miasis (Gusanera)
Solución al 0.5 % Bovinos - Equinos Ovinos - Aves	1 kg/200 L de agua 250g/50 L de agua 50g/10 L de agua 15g/ 3 L de agua	Maléfagos (piojos mastigadores) Piojos chupadores Ácaros de la sarna Moscas Nigua
Solución al 2 %	1 kg/50 L de agua	Sarna sarcóptica (cerdo)
Solución al 10 % Bovinos - Equinos	1 kg/10 L de agua 250g/2.5 L de agua 50g/ 0.5 L de agua 15g/ 150 mL de agua	Habromatosis Stephanofilaria sp Stephanurus sp



REG I.C.A. No.: 7839 MV

PRESENTACIONES:

Tarro por 1000 g. tarro por 250 g. caja por 50 sobres de 15 g

"Para emergencias químicas.

llamar a ARL SURA (Servicio las 24 horas) CISTEMA: 018000511414 Opcion 1(Colombia)"

AGROZ, UNA EMPRESA FEDEARROZ AL SERVICIO DEL SECTOR PECUARIO COLOMBIANO.
PIDALOS EN TODOS LOS ALMACENES VETERINARIOS DEL PAIS O CON SU DISTRIBUIDOR DE CONFIANZA.

www.agroz.com.co

