

Sección 2

DOMINEX[®] 10 EC

Insecticida Agrícola

CONCENTRADO EMULSIONABLE EC

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Alpha-cypermethrin.....100 g / L
(S)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (1*R*,3*R*)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate,
de formulación a 20°C.

Ingredientes Aditivos:c.s.p. 1 / Litro

Registro de Venta ICA No. 3250
Titular del registro: FMC Latinoamérica S. A.

CONTENIDO NETO:

No. Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Importado por:

FMC FMC Latinoamérica S.A.
Av. Cra 45 No 100 – 12 oficina 701
Bogotá D.C. – Colombia
Tel: (57 1) 6351504
Fax: (57 1) 6351480
®Marca Registrada de FMC Corporation

Distribuido por:

Arysta LifeScience Colombia S.A.
Carrera 2 Este # 15 – 82 Barrio El Cortijo, Madrid, Cundinamarca
Tel: (57) 1 8250482. Fax: (57) 1 8252157. Colombia.



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
MEDIANAMENTE TOXICO
CUIDADO

(Banda AZUL)

Sección 1

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

DOMINEX® 10 EC es un insecticida piretroide sintético con acción por contacto e ingestión, con categoría toxicológica III (Medianamente Tóxico) por lo cual recomendamos el cumplimiento de las siguientes precauciones durante el uso y manejo del producto.

No ingiera este producto, ni inhale o aspire la neblina de aspersión.

Utilice ropa protectora, overol, botas, delantal, gafas, respirador y guantes durante el manipuleo y la aplicación. No ingresar al área tratada antes de 6 horas, si necesita entrar antes del periodo de reentrada, use pantalón y camisa de manga larga y botas.

Después de usar el producto, lave el equipo de aplicación, la ropa de protección, báñese con abundante agua y jabón y cámbiese de ropa.

Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado y almacenarlo en sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar fresco, seco y ventilado), no almacenar en casa de habitación.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrole la etiqueta.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por mínimo 15 minutos. En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

En caso de ingestión no suministre líquidos de cualquier tipo, no suministre leche, crema u otras sustancias que contengan grasas vegetales o animales ya que ellas incrementan la absorción, **NO INDUZCA AL VÓMITO. No suministrar ninguna sustancia vía oral cuando la persona este inconsciente.**

En caso de inhalación lleve al paciente a un lugar aireado, facilite la respiración y busque atención médica.

**NÚMERO TELEFÓNICO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS:
CISPROQUIM Fuera de Bogotá 01 8000 916012, En Bogotá 2886012**

TRATAMIENTO MÉDICO

No se conoce antídoto específico. Remoción del paciente del lugar de exposición y tratamiento sintomático.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

**TÓXICO PARA LAS ABEJAS.
NO APLICAR EN ZONA DE POLINIZACIÓN DE LAS ABEJAS.**

Para la protección de la fauna terrestre o acuática, evite que el producto **DOMINEX® 10 EC** entre en contacto con áreas fuera del cultivo a tratar.

En caso de derrame del producto **DOMINEX® 10 EC**, absorba y recoja con aserrín o cal y deseche de acuerdo con la autoridad local competente.

ADVERTENCIA: NINGUN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA POTABLE.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILICÉLO PERFORÁNDOLO Y DEPOSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES.

Fecha de aprobación ICA: 16/ 12 / 2010



(Banda AZUL)

Sección 3

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

DOMINEX® 10 EC: ingrediente activo Alpha-cypermethrin pertenece a la Familia química Piretroide. La acción insecticida de **DOMINEX® 10 EC** es por contacto e ingestión.

CULTIVO	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS DE APLICACIÓN	P.C	P.R
Arroz	Gusano cogollero <i>Spodoptera frugiperda</i>	250 ml/ha	14 días	6 Horas
Papa	Pulguilla de la papa <i>Epitrix cucumeris</i>	300 ml/ha	20 días	
Maíz	Gusano cogollero <i>Spodoptera frugiperda</i>	250-300 ml/ha	14 días	
Clavel	Trips <i>Frankliniella occidentalis</i>	0.5-0.7 m/L volumen de aplicación entre 1400 y 1600 L/ha	N.A	N.A

P.C.: Periodo de Carencia P.R.: Periodo de Reingreso N.A.: No Aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **DOMINEX® 10 EC** de acuerdo a la recomendación de un ingeniero agrónomo, de acuerdo a la intensidad de la infestación y/o cuando aparezcan las primeras plagas.

DOMINEX® 10 EC debe ser incorporado dentro del plan de manejo integrado de plagas y ser rotado con otros insecticidas que posean un mecanismo de acción diferente para prevenir la resistencia cruzada.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Para preparar la mezcla agregue primero el agua al tanque de aspersión hasta un 1/3 o 1/2 de su capacidad e inicie la agitación mientras adiciona **DOMINEX® 10 EC** en la dosis recomendada, continúe agitando hasta obtener la dispersión uniforme del producto en el agua, finalmente complete el volumen de la aspersora.

FITOTOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD

No es fitotóxico cuando se emplea bajo las dosis y las recomendaciones de la etiqueta.

Se recomienda revisar la compatibilidad en la mezcla de tanque con productos agroquímicos nuevos en el mercado o cuando exista alguna duda del asistente técnico.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD

“El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

