

Composición:

200 gramos de Paraquat, ingrediente activo, por litro de producto comercial.

Características físicas y químicas:

Familia química:	Bipiridilo
Clasificación toxicológica:	II
Usos:	Herbicida

Modo de acción:

Es un herbicida no selectivo de contacto post-emergente, tiene acción particularmente sobre gramíneas anuales y maleza de hoja ancha. Cuando las condiciones climáticas son cálidas y soleadas, la actividad herbicida se observa en pocas horas. Aplicar cuando las malezas no tengan más de 15 centímetros de altura o bien tengan de 3 a 4 hojas formadas.

Usos:

Cultivo	Malezas a controlar Nombre común (Nombre científico)	Dosis/ha	P.C. Días	P.R. Horas
ARROZ	Amor seco <i>Bidens pilosa</i> Arroz rojo <i>Oriza sativa</i> Batatillas <i>Ipomoea congesta</i> Botoncillo <i>Eclipta alba</i> Cortadera <i>Cyperus esculentus</i> Dormidera <i>Mimosa púdica</i> Escoba Sida <i>acuta burn</i> Guarda rocío <i>Digitaria sanguinalis</i> Hierba de chivo <i>Ageratum conyzoides</i> Pata de gallina <i>Eleusine indica</i> Pega pega <i>Desmodium tortuosum</i> Uchuva <i>Physalis angulata</i> Yerba de sapo <i>Euphorbia hirta</i> Pasto guinea <i>Panicum maximum</i>	1.5 a 3.0 L/Ha Aplicación dirigida a malezas de menos de 25 cm de altura	N.A.	12

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de PRECISAGRO.

PAPA	Diente de león <i>Taraxacum officinale</i> Lengua de vaca <i>Rumex conglomerata</i> Trebol rojo <i>Trifolium pratense</i> Trebol blanco <i>Trifolium repens</i> Pasto kikuyo <i>Pennisetum clandestinum</i> Raygrass <i>Lolium multiflorum</i> Helecho <i>Pteridium aquilinum</i>	1.5 a 3.0 L/Ha Aplicación dirigida a malezas de menos de 25 cm de altura	N.A.	12
------	---	---	------	----

P.C.: Período de carencia: Intervalo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R.: Período de Reingreso: Período que debe transcurrir entre la última aplicación y la reentrada al área aplicada.

N.A.: No aplica

Presentaciones:

10,20,30,50,60,70,100,150,200,250,500 cm³, 1,2,3,4,5,10,20,25,50,100,200,205 y 1000L

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de PRECISAGRO.