

Composición:

600 g/kg Metsulfuron Metil.

Características físicas y químicas:

Clasificación toxicológica:	III
Usos:	Herbicida

Modo de acción:

Es un herbicida para el control selectivo de malezas de hoja ancha en arroz y potreros. Inhibe rápidamente el crecimiento de las malezas; los síntomas típicos (amarillamiento, enrojecimiento y necrosis) se observan de una a tres semanas después de la aplicación dependiendo del estado de crecimiento y susceptibilidad de las malezas. EUREKA 60 WG ofrece los mejores resultados cuando es aplicado sobre maleza en activo crecimiento y en los primeros estados de desarrollo.

Usos:

Cultivo	Malezas a controlar Nombre común (Nombre científico)	Dosis p.c. g/ha	Precauciones de aplicación	P.C. Días	P.R. Horas
ARROZ	Batatilla (<i>Ipomoea hirta</i>) Clavito (<i>Jussiaea linnifolia</i>) Bledo (<i>Amaranthus dubius</i>) Botón blanco (<i>Eclipta alba</i>) Chilinchil (<i>Cassia tora</i>) Pegapega (<i>Desmodium tortuosum</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Palo de agua (<i>Amaina coccinea</i>) Dormidera (<i>Mimosa sp</i>) Falsa caminadora (<i>Ischaemun rugosum</i>) Piñita (<i>Murdania nudiflora</i>) Tripa de pollo (<i>Euphorbia hirta</i>) Lechosa (<i>Euphorbia hirta</i>) Suelda con suelda (<i>Commelina difusa</i>)	15	Post-emergencia total: Aplique desde 15 días (4-5 hojas) hasta 35 días de la emergencia del cultivo. Las malezas deben tener hasta 7 hojas (10-15 cm de altura). Por ningún motivo aplique después de los 35 días porque las estructuras de reproducción de arroz son muy susceptibles y se puede causar un daño severo al cultivo.	30	4

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de PRECISAGRO.

POTREROS	Chilinchil (<i>Cassia tora</i>) Bledo (<i>Amaranthus dubius</i>) Dormidera (<i>Mimosa sp</i>) Hierba de polla (<i>Commelina difusa</i>) Masiquia (<i>Bidens pilosa</i>) Botoncillo (<i>Eclipsa alba</i>) Batatilla (<i>Ipomea sp</i>) Cundeamor (<i>Momordica charantia</i>) Pegapega (<i>Desmodium tortuosum</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Venturosa (<i>Lantana cámara</i>) Clavito (<i>Jussiaea linnifolia</i>) Tripa de pollo (<i>Euphorbia hirta</i>) Mortiño (<i>Clidemia hirta</i>) Escoba (<i>Sida rhombifolia</i>) Rabo de ratón (<i>Achyranthes indica</i>)	1.5-3.0 g p.c./20 l	En pastos dedicados a la obtención de semilla, aplique EUREKA 60 WG antes del inicio del primordio floral, porque puede producir daño a la semilla	NA	4
	Helechos (<i>Pteridium aquilinum</i>)	3.0 g p.c/20 l	Debido a la consistencia cerosa y lisa del helecho se hace necesaria la adición de un surfactante para mejorar la adherencia/penetración del producto		

P.C.: Período de carencia: Intervalo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R.: Período de Reingreso: Período que debe transcurrir entre la última aplicación y la reentrada al área aplicada.

N.A.: No aplica

Presentaciones:

100,250,500 cm3

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de PRECISAGRO.

Versión 01