FINALE® SL

- **Concentrado soluble- SL**
- **Derivado fosfínico Inhibidor de la glutamine sintetasa**
- **Herbicida agrícola**
- **Reg. de venta ICA 2550**
- **Titular del Registro Bayer S. A.**

Composición garantizada:
Ingrediente activo: Glufosinato de amonio: ammonium (2RS) – 2-ami- no-4-(methylphosphirato)butyric-acid; 150 g por litro de formulación a 20 ℃.
Ingredientes aditivos:…….c.s.p. 1 litro

Precauciones y advertencias de uso y aplicación:
- Causa irritación a los ojos. Evite el contacto con la piel y la ropa.
- Nocivo si es ingerido. No aspire sus vapores o la neblina de aspersión.
- Utilizar ropa de protección adecuada al manipular, aplicar el pro- ducto; y para ingresar al área tratada antes de terminar el periodo de re-entrada
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de aplicar el producto báñese con abundante agua y jabón, lave la ropa contaminada.
- No permita animales en el área tratada.
- Verificar el buen estado del equipo de aplicación y calíbrelo previa- mente. No sople con la boca las boquillas obstruidas; utilice un cepi- llo para destaparlas.

Instrucciones de almacenamiento:
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No reenvase el producto.
- No almacenar en casas de habitación. Almacene el producto en sitios seguros retirados de alimentos y medicinas de consumo humano y animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco, seco y ventilado).
- Transpórtelo solamente con productos agroquímicos, NO con productos de consumo humano y animal.

Instrucciones de primeros auxilios:
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua por mínimo 15 minutos, cubra el ojo afectado y lleve el paciente al médico.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y bañe al paciente con abundante agua y jabón y lleve al médico.
- En caso de intoxicación por inhalación, retire la víctima de la zona de contaminación, lleve al aire libre y mantenga al paciente acostado de medio lado y vigile que éste respire.

Guía para el médico:
- Medidas de descontaminación general. Si ha sido ingerido, practicar lavado gástrico terminando con carbón activado y sulfato sódico.
- Terapia de convulsiones: benzodiacepina se debe dar de acuerdo con las dosis estándar, si no es eficaz, Fenobarbital sódico por vía intra- muscular o por vía intravenosa (lentamente).
- Mantener libres las vías respiratorias

Bayer CropScience una división de Bayer S. A.
Línea 01 8000 111 212
Bogotá, D.C., Colombia
® Marca Registrada

Medidas para la protección del medio ambiente:
• En caso de derrame, recoger con materiales absorbentes (aserrín, o tierra seca), guardarlo en bolsa plástica y/o caneca y deseche acorde con la entidad local competente.
• No asperjar áreas fuera del cultivo a tratar. Lave el equipo en el sitio de la aplicación y deseche esta agua en el área tratada.
• No contaminar lagos, ríos, estanques ni arroyos con desechos o envases vacíos.
• Respetar las franjas de seguridad en relación a cuerpos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, o cual- quiera otra área que requiera protección especial, 10 metros (terres- tre) y 100 metros (área)

Se prohíbe la utilización de este envase para contener alimentos o agua para consumo
Después de usar el contenido enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, evitando salpica- duras. Luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.**
****Lleve el envase al centro de acopio más cercano del programa campo limpio, luego de realizar el triple lavado.**

EN CASO DE DERRAME O INCENDIO COMUNICARSE CON: CISPROQUIM. Teléfonos: (1) 2 88 6012 en Bogotá. Fuera de Bogotá, línea 01 8000 916012.
LÍNEA BAYER CROPSCIENCE DE SERVICIO AL CLIENTE 01 8000 111212.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Generalidades:
FINALE® SL es un herbicida de contacto con ligera sistemia, recomen- dado para el control de malezas anuales y perennes, para aplicación en post-emergencia.
P.C. Periodo de carencia: No aplica ya que bajo las condiciones de uso recomendadas y la degradación del producto no se esperan residuos en el cultivo.
P.R. Periodo de Reentrada: Dado que es un herbicida no es aplicado al cultivo, sino a las malezas a con- trolar, no se espera una exposición potencial del trabajador al realizar labores al cultivo, puede ingresar al área tratada después de la finalización de la aplicación, utilizando botas, overol de manga larga y pantalón largo, si requiere alguna labor en el suelo o alguna actividad que pueda entrar en contacto con las malezas aplicadas usar guantes
1 Para obtener una completa seguridad sobre el cultivo, se recomienda aplicar el producto cuando las plantas tengan una altura no inferior a 30 cm.
3 Variedades de maíz tolerantes al herbicida glufosinato de amonio, que contienen el gen bar, que codifica la proteína PAT, como por ejemplo **Herculex®** I (co-desarrollo Pioneer y Dow AgroScience).

MALEZAS QUE CONTROLA: Pajón: ***Paspalum fasciculatum;*** patega- llina: ***Eleusine indica;*** liendrepuerco: ***Echinochloa colonum;*** pasto horqueta: ***Paspalum conjugatum;*** paja mona: ***Leptochloa filiformis;*** cortadera: ***Cyperus ferax;*** coquito: ***Cyperus rotundus;*** caminadora: ***Rottboellia exaltata;*** siempreviva: ***Commelina diffusa;*** batatilla: ***Ipomoea spp., Oldenlandia spp.;*** sornia: ***Blechum pyramidatum;*** rabo de gato: ***Acalypha alopecuroides;*** baquina: ***Pothomorphe pel-tata;*** pasto de leche: ***Ixophorus unisetus;*** bejuco de pata: ***Batocydia unguis;*** hierba del pájaro: ***Borreria laevis;*** yerba de sapo o lechosa: ***Euphorbia hirta;*** pega pega: ***Desmodium tortuosum;*** papunga: ***Bi- dens pilosa;*** emilia: ***Emilia sonchifolia;*** guasca: ***Galinsoga sp.;*** ca- dillo: ***Cenchrus brownii;*** gramalote: ***Paspalum sp.;*** malva: ***Malachra alceifolia;***granadilla: ***Panicum fasciculatum;*** cotorrera: ***Julocroton argenteus;*** cotorrera: ***Heliotropium indicum;*** argentina:***Cynodon da ctylon;*** chilinchil: ***Cassia tora;*** atarraya: ***Kallstroemia maxima;*** bledo: ***Amaranthus spinosus;*** bejuco peludo: ***Merremia aegyptia;*** meloncillo: ***Cucumeris melo;*** pajón: ***Paspalum paniculatum;*** verdo- laga común: ***Portulaca oleracea;*** paja mona: ***Leptochloa filiformis;*** mariguano o invasora: ***Parthenium hysterophorus;*** anisillo:***tagetes patula;*** escoba: ***Sida rhombifolia;*** braquiaria: ***Brachiaria mutica;*** balsamina, archucha: ***Momordica charantia;*** pega-pega: ***Desmo- dium spp.;*** uvito: ***Cordia dentada;*** cansaviejo: ***Mascagnia concinna;*** tamarindillo: ***Cassia mimosoides;*** corrimiento: ***Sarcostemma glau- cum;*** paulina, bejuco de costilla: ***Paullinia pinnata;*** platanillo o barba de chivo: ***Cleome spp.;*** frijolillo: ***Phaseolus lathyroides;*** caperonia: ***Caperonia palustris;*** pasto guinea, india: ***Panicum maximum;*** uña de gato: ***Macfadyena unguis-cati;*** viernes santo: ***Phyllanthus niruri.*** Malezas que controla en Tabaco: guardarocío: ***Digitaria sp;*** patega- llina: ***Eleusine indica;*** liendrepuerco: ***Echinochloa spp;*** caminadora: ***Rottboellia exaltata, Caperonia palustris;*** bledo: ***Amaranthus spp;*** uchuva: *Physalis angulata;* batatilla: ***Ipomoea spp.***

Bayer CropScience una división de Bayer S. A.
Línea 01 8000 111 212
Bogotá, D.C., Colombia
® Marca Registrada

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Debe ser aplicado en post-emergencia, dentro de un programa de manejo integrado en rota- ción con otros herbicidas de diferente mecanismo de acción, siguiendo las recomendaciones del Comité de Prevención de Resistencia a Her- bicida HRAC y complementando con prácticas de manejo integrado de cultivo.
Se recomienda aplicar con volúmenes de agua de 100 y 400 litros por hectárea, dependiendo del cultivo, cuando se utilicen equipos terres- tres. Con equipo de aplicación, bomba convencional, requiere el uso de pantalla en la aplicación.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Antes de efectuar mezclas, debe realizar previamente pruebas de compatibilidad (miscibilidad) y fito-compatibilidad con el producto que se desea mezclar.
FINALE® SL en las dosis y frecuencia recomendadas es compatible con cultivos registrados; sin embargo se recomienda pruebas de fito- compatibilidad con nuevas variedades y/o híbridos.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en el envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

PRESENTACIONES: 1, 5 y 200 litros.

PRECAUCIÓN

Categoría toxicológica: IV LIGERAMENTE TÓXICO

Bayer CropScience una división de Bayer S. A.
Línea 01 8000 111 212
Bogotá, D.C., Colombia
® Marca Registrada