

FITORAZ® WP 76



- Polvo mojable - WP
- Dithiocarbamato + cyanoacetamide oxime
- Fungicida
- Reg. ICA 2101
- Titular del Registro Bayer S. A.

Composición garantizada:

Ingredientes activos: Propineb: Polymeric zinc 1,2-propylenebis (dithiocarbamate); de formulación a 20°C 700 g/kg

Cymoxanil: 1- [(EZ)-2-cyano-2-methoxyiminoacetyl] – 3- ethylurea; de formulación a 20 °C 60 g/kg

Ingredientes aditivos:.....c.s.p 1 Kg

Precauciones y advertencias para el usuario:

FITORAZ® WP 76 es un fungicida medianamente tóxico. Se recomienda observar todas las precauciones necesarias en el manejo y la aplicación de plaguicidas.

Ver: PRECAUCIONES GENERALES DE USO.

Ver: PRECAUCIONES GENERALES PARA EL AMBIENTE.

Almacenamiento:

Este producto no es inflamable.

Ver: NORMAS DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DERRAMES.

En caso de derrame o incendio llamar a: CISPROQUIM. Teléfonos (091) 2886012 en Bogotá. Fuera de Bogotá, línea 01 8000 916012.

Línea Bayer CropScience de servicio al cliente 01 8000 111212.

Instrucciones de uso y manejo:

Consulte con un ingeniero agrónomo.

FITORAZ® WP 76 es un fungicida protectante y curativo, tiene actividad de contacto y sistémico local e inhibe la esporulación se recomienda su uso dentro de un manejo integrado de cultivo.

Primeros auxilios:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta adjunta.
- En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua por mínimo 15 minutos, cubra el ojo afectado y lleve al paciente al médico.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y bañe al paciente con abundante agua y jabón y lleve al médico.

Bayer CropScience una división de Bayer S. A.

Línea 01 8000 111 212

Bogotá, D.C., Colombia

® Marca Registrada

- En caso de intoxicación por inhalación, retire la víctima de la zona de contaminación, lleve al aire libre y mantenga al paciente acostado de medio lado y vigile que éste respire.
- Induzca el vómito si el tiempo transcurrido desde la ingestión es menor a una hora, y si la persona está totalmente consciente. Posteriormente de a beber una suspensión de 20 – 30 gr. de carbón activado en 150-200 ml. de agua.

Guía para el médico:

Medidas de descontaminación general, si ha sido ingerido practica lavado gástrico, terminando con carbón activado y sulfato sódico.

No hay un antídoto específico por lo tanto cualquier tratamiento debe ser sintomático

No es un inhibidor de la colinesterasa, NO administrar atropina

Mantener libres las vías respiratorias

1 P.C periodo de carencia: Días entre la última aplicación y la cosecha

2 P.R Periodo de re-entrada: Periodo restringido (no prohibido) entre la aplicación y la re-entrada del personal al área aplicada (12 horas), siempre verifique que la superficie foliar este seca. Si requiere realizar alguna labor antes de cumplirse el periodo de re-ingreso (ej, monitoreo de la aplicación), debe utilizar overol, botas y guantes

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: para el cultivo de arveja se recomienda realizar aplicaciones cada 5 a 7 días de **FITORAZ® WP 76** con base en los resultados del monitoreo de la enfermedad, susceptibilidad de la variedad y las condiciones ambientales predominantes

FITORAZ® WP 76 debe ser aplicado dentro de un programa de rotación con otros fungicidas de diferente mecanismo de acción, siguiendo las recomendaciones del Comité de Prevención de Resistencia a Fungicidas-FRAC y complementado con prácticas de manejo integrado del cultivo

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Antes de efectuar mezclas, debe realiza previamente pruebas de compatibilidad (miscibilidad) y fito-compatibilidad con el producto que se desea mezclar

FITORAZ® WP 76 en la dosis y frecuencia recomendadas es compatible con los cultivos registrados, sin embargo se recomienda pruebas de fitocompatibilidad con nuevas variedades y/o híbridos

Ver: INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD.

PRESENTACIÓN: 500 gr.

Categoría toxicológica: III MEDIANAMENTE TÓXICO