FORDAZIM 500 SC

PRECISAGRO®

FORDAZIM 500 SC

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

FUNGICIDAS

Composición:

500 g/Lt de Carbendazim

Características físicas y químicas:

Clasificación toxicológica:	II
Usos:	Fungicida

Modo de acción:

Es un fungicida selectivo, sistémico de acción preventiva, curativa y de rápida penetración. Tiene un amplio espectro de control y pertenece al grupo de los Benomidazoles.

Usos:

Cultivo	Blanco biológico	Dosis	P.C. Días	P.R. Horas
Sorgo	Complejo fungoso (*Colletotrichum sp) (Penicilium sp),(Altemaría sp) (Cladosporium sp) (Drechstera sp), (Gibberella sp)*	500 cc/ha solo en mezcla con 1.000 cc de azufre 720 g/L. Aplicación vía terrestre: en un volumen de 200 L de agua. Época de aplicación: 1. A los 40 DDG*(embuchamiento). 2. A los 80 DDG (floración). DDG*: Días después de germinado.	10	12
Arroz	Piricularia (*Pyricularia grisea)*	400-600 cc/ha	10	12
	Añublo de la vaina *(Rhizoctonia solani)*	500 cc de p.c./ha Aplicación temprana: Durante el macollamiento (aprox. 35 DDG) Aplicación tardía: Durante el embuchamiento (aprox. 75 DDG)	15	12
Banano	Sigatoka negra *(Mycosphaerella fijensis)*	600 cc/ha	7	4
Café	Antracnosis *(Colletotrichum coffeanum)* Mancha de hierro *(Cercospora coffeicola)*	120-160 cc/ha	7	12

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de PRECISAGRO.

Versión 01

Melón	Oidium (*Erysiphe cichoracearum)* Antracnosis (*Colletotrichum lagenarium)* Moho gris Botrytis (*Botrytis sp)*	60-80 cc/100 L de agua	10	12
Piña	Pudrición de las hojas (*Thielaviopsis paradoxa)*	30-60 cc/100 L de agua	15	12
Cacao	Moniliasis (*Moniliophtora roreri)*	60-80 cc/100 L de agua	15	12
Yuca	Mancha de las hojas (*Cercospora sp)*	60-80 cc/100 L de agua	15	12
Mango	Antracnosis (*Colletotrichum gloesporioides)*	500 cc/ha. Epoca de aplicación al momento de la floración y después a los 8-15 días.	7	12
Fresa	Pudrición del fruto (*Botrytis cinérea)*	70-120 cc/100 L de agua	14	12
Arveja	Pecoseo o nevada (*Ascochyta sp)*	300-500 cc/ha	7	12
Tomate	Moho gris *(Botrytis cinnerea)*	80 cc/200 L de agua	7	4
USO ORNAMENTALES*				
Rosa	Moho gris *(Botrytis cinnerea)*	0.5 cc/L de agua	N.A.	4

P.C.: Período de carencia: Intervalo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
P.R.: Período de Reingreso: Período que debe transcurrir entra la última aplicación y la reentrada al área aplicada.
N.A.: No aplica
* Se realizaron pruebas de fitotoxicidad en pompón y clavel.

Presentaciones:

40,50,100,150,200,250,375 y 500 cc.
1,2,3,4,5,10,15,20,25,30,40,50,60,100,105,120,150,200,220,250,260,300,320,350,500 y 1000 L

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de PRECISAGRO.