

Composición:

250 g/lt de Propiconazol.

Características físicas y químicas:

Clasificación toxicológica:	II
Usos:	Fungicida

Modo de acción:

Es un fungicida triazol, selectivo, sistémico y traslaminar, de acción preventiva y curativa residual. Frena el avance del micelio e impide la esporulación de enfermedades en Banano, Arroz y otros cultivos.

Usos:

Cultivo	Plaga a controlar	Dosis/ha	P.C. Días	P.R. Horas
Arroz	Complejo de manchado del grano (<i>Helminthosporium oryzae</i> , <i>Rhynchosporium oryzae</i> , <i>Curvularia lunata</i>)	0.5 L/ha	30 días	12 horas
Banano	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	0.4 L/ha	1 día	4 horas

P.C.: Período de carencia: Intervalo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R.: Período de Reingreso: Período que debe transcurrir entre la última aplicación y la reentrada al área aplicada.

N.A.: No aplica

Presentaciones:

1,20 y 200 Litros.

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de PRECISAGRO.