



TITULAR PROFICOL ANDINA B.V SUCURSAL COLOMBIA

Tipo de producto:	Herbicida de uso Agrícola
Formulación:	Concentrado emulsionable.
Ingrediente activo:	Oxyfluorfen
Concentración:	240 gramos por litro
Categoría Toxicológica:	III – Medianamente tóxico
Cultivo:	Cebolla de bulbo, cebolla de rama, cebollines, puerro, arroz y café.
Target:	Malezas gramíneas y hojas anchas en pre-emergencia, post-emergencia temprana y post-emergencia dirigida.
Presentación:	250 cc, 1 y 20 litros.

Grupo químico: Difeniléteres

Modo de acción: Herbicida selectivo pre y post-emergente temprano, con acción de contacto y levemente sistémico. Controla malezas, gramíneas, ciperáceas y hojas anchas, en diversos cultivos. Su actividad herbicida se produce al alterar el funcionamiento de las membranas celulares, detener el crecimiento y producir la posterior muerte de los tejidos.

Mecanismo de acción: Desorganiza la formación de las membranas, inhibiendo la enzima Protoporfirinógeno oxidasa (PPO). Una vez la luz forma los radicales libres que causan la rotura de las membranas, se produce el derrame del contenido celular y la muerte de los tejidos. Cuando se aplica como pre-emergente el producto es más activo por absorción a través del coleóptilo y epicótilo de las plantas, que a través del sistema radicular. Una vez es absorbido, su traslocación desde las raíces a las hojas es muy limitada. En post-emergencia a las malezas, su acción es de contacto y es absorbido por tallos, hojas y en menor proporción por las raíces.

Riesgo de resistencia: De acuerdo con los informes de la HRAC (Herbicide Resistance Action Committee), los herbicidas deben ser evaluados de acuerdo al uso zonal. El Oxyfluorfen es calificado con un riesgo “Bajo” debido a que su aplicación es mayoritariamente en pre-emergencia y que generalmente es aplicado en mezcla, con otros productos de diferente mecanismo de acción.

Generalidades:

Calle 1C No. 7-53 Interior Zona Franca. Tels: 3799772-3799773 – Barranquilla-Colombia
E-mail: contact.us@proficol.com • Web: www.proficol.com

GALIGAN 240 EC es un herbicida pre-emergente recomendado para el control de malezas gramíneas y de hoja ancha en cultivos de Arroz, café almácigos, café establecido, caña de azúcar en plantilla, yuca, cebolla de bulbo y rama, Puerro, Cebollines, arveja, banano, plátano y palma africana, algodón, no labranza y labranza mejorada en algodón. Ofrece un largo efecto residual que permite mantener el cultivo limpio durante el período crítico de competencia de malezas. En algunos casos puede usarse en post-emergencia temprana según lo indicado en la etiqueta para cada cultivo en particular.

Posee acción residual prolongada para un control más duradero y económico, sumado al amplio espectro de control de malezas de hoja ancha, algunas ciperáceas y gramíneas incluyendo las diferentes especies de *Echinochloa colona* y la Falsa caminadora *Ischaemum rugosum*. Elimina aplicaciones adicionales, reduciendo el uso de la mano de obra o costosos parcheos químicos. El producto se degrada completamente permitiendo normal rotación de cultivos.

GALIGAN 240 EC es selectivo al arroz en preemergencia total con dosis de 1.0 a 1.2 litros por hectárea. No es afectado como otros herbicidas por lluvias fuertes. Se redistribuye uniformemente en el campo por el riego o en el sistema de piscinas.

Recomendaciones de uso:

CULTIVO	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	P.R	P.C
Cebolla de bulbo	Yerva clara <i>(Salvia tiliaefolia)</i> , Coquito <i>(Cyperus aggregatus)</i> , Acedera <i>(Oxalis corniculata)</i> , Guasca <i>(Galinsoga ciliata)</i> , Barbasco <i>(Polygonum hydropiperoides)</i> , Nabo Amarillo <i>(Brassica campestris)</i> , Pasto Estrella <i>(Cynodon lectostachyus)</i> .	1.0 L/ha. Para el control en pre-emergencia.	0 horas	N.A
Cebolla de rama				
Cebollines				
Puerro*		1.5 L/ha en post-emergencia temprana cuando las malezas alcancen 3 hojas verdaderas o menos. Usar 200 L de mezcla por Hectárea		

Arroz	Falsa caminadora <i>(ischaemum rugosum)</i> Liendre puerco <i>(Echinochloa colona)</i> Paja mona <i>(Leptochloa filiformis)</i> Guarda rocío <i>(Digitaria sanguinalis)</i> Cortadera <i>(Cyperus iria)</i> Barba de indio <i>(Fimbristylis miliacea)</i> Palo de agua <i>(Jussiaea linifolia)</i>	1.2 L/ha para suelos de textura liviana		
		1.5 L/ha para suelos de textura pesada. Las aplicaciones se deben usar entre 130 y 180 L/ha		
Café	Amor seco <i>(Bidens pilosa)</i> suelda con suelda <i>(Commelina diffusa)</i> , Batatilla <i>(Ipomoea purpurea)</i> Gramalote <i>Paspalum sp.</i>	3.5 L/ha cuando se utiliza un volumen de mezcla de entre 600 y 800 L/ha		
Piña	Papunga (<i>Bidens pilosa</i>) Liberal (<i>Emilia sonchifolia</i>) Meloncillo (<i>Cucumis sp.</i>)	1.0 L/ha		
	Rodes (<i>Cloris gayana</i>) Cepillo (<i>Setaria geniculata</i>)	1.5 L/ha		
Repollo	Guasca (<i>Galinsoga ciliata</i>) Ortiga (<i>Urtica urens</i>) Rábano (<i>Raphanus raphanistrum</i>) Roripa (<i>Rorippa palustris</i>) Cilantro (<i>Coriandrum sativum</i>)	1.0 L/ha en pre-trasplante, en suelos livianos		
		1.5 L/ha en pre-trasplante, en suelos pesados y con alta infestación de malezas.		

*Según Resolución ICA No. 4754 del 7 de diciembre de 2011.

**Al cultivo y a las malezas entre 1 a 3 días inmediatamente después de la primera lluvia o riego de germinación.

***GALIGAN® 240 EC ofrece suficiente control de malezas comunes en arroz, tanto gramíneas: liendre puerco (*Echinochloa spp*) y guarda rocío (*Digitaria sanguinalis*), como

ciperáceas: cortadera (*Cyperus diffusus*, *Torulinium odoratum*). Durante 2–3 semanas debe ser complementado con la aplicación normal de propanil

APLICACIÓN:

Cebolla: Aplicar en pre-emergencia o en post-emergencia temprana de acuerdo a las dosis recomendadas, dependiendo de la densidad de maleza en el lote. En Cebolla de bulbo usar 200 L de mezcla por Hectarea. En cebolla de rama se recomienda aplicar después de 5 días de efectuado el trasplante o deshije.

Arroz: se recomienda Galigan para el control de malezas, en aplicaciones pre-emergentes, a las dosis recomendadas, en aplicaciones con buena humedad. Usar volúmenes de agua de 130 a 180 UHa.

Café: control de malezas de hoja ancha y gramíneas. Usar un volumen de mezcla entre 600 -800 L/ha para asperjar en lotes con plantas de café de 70 cm de porte medio. Aplicar en suelo limpio y con buena humedad.

Piña: Aplicar en pre-emergencia cuando se utiliza un volumen de mezcla de 480 L/ha para asperjar las plantas de piña de porte entre 0.55-0.75 m en estado de postrasplante (50-60 días después de trasplante).

Repollo: Aplicar con volúmenes de agua entre 250-300 L/ha.

GALIGAN® 240 EC no tiene efecto fitotóxico sobre la planta de café, sin embargo, se debe evitar el contacto del producto con los meristemos de las plantas.

En arroz se pueden presentar algunas plantas con clorosis en el coleóptilo, lo cual no es persistente ni progresivo, observándose pronta recuperación.

El producto es selectivo al cultivo de cebolla de bulbo, pero puede mostrar durante los primeros días después de aplicado una ligera fitotoxicidad caracterizada por un retardo en el desarrollo del cultivo. Posteriormente, se observa un normal desarrollo de los bulbos. En cebolla de rama, puede ocasionar quemazón apical de las hojas, pero este daño desaparece 10 días después.

Compatibilidad y fitotoxicidad:

Debido al número de cultivos menores y a las diferentes variedades de los cultivos registrados, el usuario asume la responsabilidad del uso del producto, por lo que se recomienda realizar una prueba preliminar para determinar la selectividad antes de la aplicación general. Si se mezcla con otros productos, igualmente se deberá, bajo responsabilidad del usuario, realizar evaluaciones previas para determinar la compatibilidad y fitocompatibilidad.

GALIGAN® 240 EC no tiene efecto fitotóxico sobre la planta de café, sin embargo, se debe evitar el contacto del producto con los meristemos de las plantas. En arroz se pueden presentar algunas plantas con clorosis en el coleóptilo, lo cual no es persistente ni progresivo, observándose pronta recuperación. El producto es selectivo al cultivo de cebolla de bulbo, pero puede mostrar durante los primeros días después de aplicado una ligera fitotoxicidad caracterizada por un retardo en el desarrollo del cultivo. Luego de 10 días, se observa un normal desarrollo del



cultivo. En cebolla de rama, puede ocasionar algunos síntomas de fitotoxicidad, pero este daño también desaparece 10 días después

Elaborado por:
Departamento Técnico PROFICOL