

2^{do}. Cuerpo.

GLIFOCAFE[®]

HERBICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO SOLUBLE SL

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Ingrediente Activo:

Glifosato: Acido Glifosato **359 g/l**, de formulación a 20°C, equivalentes a **484.5 g/l** en forma de sal isopropilamina de N- fosfonometil-glicina.

Ingredientes Aditivos: c.s.p. 1 litro

REGISTRO DE VENTA ICA No.3731

Titular del Registro: Arysta LifeScience Colombia S.A.

CONTENIDO NETO: Frascos por 500 CC y 1, 4 , 20 , 30 , 60 , 200 y 1000 litros

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

No. de Lote:

Importado por: Arysta LifeScience

Distribuido por: Arysta LifeScience Colombia S.A.

Carrera 2 Este # 15 – 82 Barrio El Cortijo, Madrid, Cundinamarca

Tel: (57) 1 8250482. Fax: (57) 1 8252157. Colombia.



Arysta LifeScience

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA IV - LIGERAMENTE TOXICO

PRECAUCION

Sección 1.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

GLIFOCAFE® es ligeramente tóxico; sin embargo, se recomienda **“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”**. Es peligroso si se ingiere.

Durante las aplicaciones **“Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”** además, equipos de protección completos.

“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”.

“Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado”.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

No han sido determinados síntomas específicos. **“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrole la etiqueta y la hoja informativa adjunta”**.

“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón”.

Ingestión: Dar de beber agua o leche, antes de inducir el vómito. Consulte a personal médico

ANTIDOTO

No existe antídoto específico. Suministre tratamiento sintomático.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 018000916012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono (57)1 2886012.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

No contamine fuentes de agua (canales de riego, lagos, lagunas, quebradas, ríos, cascadas, canales de drenaje, etc.) con los sobrantes de la aspersión.

Las áreas aplicadas no deben ser pastoreadas ni cosechadas, antes de que pase el PC (Intervalo de Seguridad entre la última aplicación y la cosecha).

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Mantenga el producto en sus envases originales en un lugar seguro, seco y fresco, **FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS, PERSONAS IRRESPONSABLES Y ANIMALES DOMESTICOS**.

Sección 1. Continuación.

No transporte ni almacene con productos de uso humano o pecuario.


Evite almacenar a temperaturas por encima de 35°C.

NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCION EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILICELO TRITURANDOLO O PERFORANDOLO Y DEPOSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA PRIMERO ESTA ETIQUETA

Fecha de Aprobación ICA: 09/06/2009



Sección 3. (Derecha)

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

INFORMACION GENERAL:

GLIFOCAFE® es un herbicida postemergente no selectivo que controla una gran gama de malezas anuales y perennes. Su acción es sistémica, penetra foliarmente y se transloca a otras partes de la planta incluido los órganos subterráneos. La muerte de las malezas se presenta entre los 7 y 15 días después de la aplicación.

GLIFOCAFE® no penetra por las raíces de los cultivos y se inactiva cuando se aplica al suelo, por lo cual no tiene actividad residual que pueda afectar las siguientes siembras.

GLIFOCAFE® tiene baja volatilidad, lo que reduce riesgos de afectar cultivos vecinos y permite su aplicación dirigida, utilizando pantallas protectoras para evitar alcanzar las partes verdes de las plantas cultivadas.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO Y DOSIS:

Arroz: 4,0 litros/ha. Se recomienda para el control de Arroz Rojo (*Oriza sativa*), Falsa Caminadora (*Ischaemum rugosum*), Pato Argentina (*Cynodon dactylon*), Bledo (*Amaranthus dubius*), Pelo de indio (*Fimbristylis annua*), cortadera (*Cyperus diffusus*), Lechosa (*Euphorbia spp.*), Cortadera *Cyperus ferax*), Batatilla (*Ipomoea spp.*). Aplique 7 días antes de la labranza del suelo y siembra del cultivo. (Uso en no labranza o en presiembra).

Café: Aplicar **GLIFOCAFE®** en dosis de 4L/Ha y un volumen de aplicación de 200L/Ha, obteniendo una acción eficaz y prolongada en el cultivo de café; las malezas controladas son: *Chloris radiata* (paja de perro); *Paspalum macrophilum* (Zacate); *Drymaria cordata* (Siempre Viva); *Commelina difusa* (Hierba de pollo); *Plantago rugelii* (Gitana Amarilla); *Polygonum mepalense* (Corazon Herido); *Siegesbeckia jorullensis* (Hierba Mala).

Caña de Azúcar: Aplicar de 1,0 a 2,0 litros/ha como madurante en cañas de 10 a 12 meses de edad. Coseche 40 a 60 días después de la aplicación.

Banano: Aplicar la mezcla **GLIFOCAFE®** más Ametrina (3,0 a 6,0 litros) para el control de Coquito (*Cyperus rotundus*), Guardarrocio (*Digitaria sanguinalis*), Pará (*Brachiaria spp.*), Liendre de Puerco (*Echinochloa colonum*), Pata de Gallina (*Eleusine indica*), Paja Peluda (*Paspalum fasciculatum*).

Potrerros: Aplicar 2,5 litros/ha para el control de Pata de Gallina (*Poa annua*). Aplicar 4,0 litros/ha para el control de Kikuyo (*Pennisetum clandestinum*), Cebadilla (*Bromus catharticus*), Ballico (*Lolium temulentum*).

3^{er}. Cuerpo. Continuación

GLIFOCAFE[®] se recomienda en plátano, cacao, palma africana, cítricos y otros frutales. Aplique antes de la siembra para el control de una gran gama de malezas y después del establecimiento en aplicaciones dirigidas a las malezas utilizando pantalla protectora para evitar que el producto entre en contacto con las hojas y otras partes verdes de las plantas, especialmente cuando están pequeñas. Durante el primer año es recomendable efectuar plateos manuales alrededor de los árboles.

Cultivos anuales: Se recomienda aplicar **GLIFOCAFE**[®] antes de la siembra, para el control de malezas de difícil manejo, dejando un período de tres a siete días antes de efectuar la labranza y sembrar los cultivos.

ÁREAS NO AGRÍCOLAS: Aplique de 2,0 a 4,0 litros/ha para el control de Yerba Agria (*Paspalum conjugatum*), Botoncillo (*Eclipta alba*), Abrojo o Botoncillo (*Althernantera sp.*), Verbena (*Verbena litoralis*), Masequia o Chipaca (*Bidens pilosa*), Botoncillo (*Melanthera nivea*), Yerba Socialista (*Emilia sonchifolia*), Botoncillo (*Boreria laevis*), Manrubio (*Ageratum conizoides*).

Para aplicaciones localizadas en especies perennes, utilice soluciones de **GLIFOCAFE**[®] del 1,0 al 2,0 por ciento (uno a dos litros de **GLIFOCAFE**[®] en 100 litros de agua).

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

Con el fin de conseguir una aplicación uniforme y con la dosis recomendada, CALIBRE EL EQUIPO DE ASPERSIÓN ANTES DE LA APLICACIÓN. Asperje sobre malezas que se encuentren en crecimiento activo.

Utilice volúmenes de agua de 100 a 200 litros por hectárea, con el equipo a presión regulada de 25 a 30 PSI, boquillas de abanico de baja descarga (TK-0,5; TJ-800050; TJ-8001).

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Antes de mezclar **GLIFOCAFE**[®] con otros herbicidas se recomienda efectuar pruebas preliminares de compatibilidad. En caso de duda, consulte con un Ingeniero Agrónomo

INFORMACION SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del registro garantiza que las recomendaciones físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

3^{er}. Cuerpo. Continuación

