REGISTRO ICA N°: 1831

TITULAR DEL REGISTRO:

UPL COLOMBIA S.A.S
Carrera 1 N° 4-02 Bodega 18, Parque Industrial K2
Chía, Cundinamarca -Colombia
PBX :(1) 8844500

FORMULACIÓN:

GRANULOS DISPERSABLES -WG

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes activos:

Azoxystrobin,…….. 50 g/kg
De formulación a 20°C.
(Methyl (E)-2-{2[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy] phenyl}- 3-methoxyacrylate,

Mancozeb,…….. 700 g/kg
De formulación a 20°C.
Manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt

Ingredientes aditivos……..…..…. c.s.p. 1 kg

DESCRIPCIÓN GENERAL:

GLORY 75 WG: Es un novedoso fungicida de amplio espectro con propiedades protectantes y sistémicas.

Glory presenta excelente control de hongos pertenecientes a clases como Ascomicetos (Mildeos polvosos), Basidiomicetos (royas y tizones), Oomicetos (Gota-Lancha o tizón tardío, Mildeos vellosos) y Deuteromicetos (manchas foliares)

Glory puede ser usado en un amplio espectro de cultivos y enfermedades gracias a su modo y mecanismo de acción.

Glory retrasa el inicio de la senescencia, prolongando el Area Verde de las Hojas (AVH)

Los cultivos tratados con Glory son capaces de lidiar mejor con el estrés de agua (eficiencia en el uso de agua)

Los cultivos tratados con Glory aumentan la habilidad del cultivo de usar eficiéntemente el nitrógeno y asimilarlo en proteinas.

La formulación de Glory tiene muy fino tamaño de partículas, lo que se refleja en una mejor solubilidad y genera una mejor dispersión sobre la supeficie de las hojas tratadas para una mejor protección contra las enfermedades.

Glory es una muy efectiva herramienta para el manejo de resistencia y es muy segura al cultivo en todas sus etapas, al aplicador, y al ambiente.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:

Mancozeb: Inactiva a los grupos sulfidril de los aminoácidos y la actividad enzimática de las células fúngicas, formando complejos con aquellas que tienen metales, lo que provoca la disrupción del metabolismo de los lípidos, respiración y producción de ATP, (Adenosin trifosfato). Ataca al metabolismo del hongo en diferentes partes o rutas del ciclo de Krebs, por lo que se le denomina acción multisitio, lo cual genera con gran seguridad pocas probabilidades de adquirir resistencia.
Azoxystrobin: Fungicida con propiedades protectoras, curativas, erradicantes, translaminares y sistémicas. Inhibe la respiración mitocondrial por bloqueo de la transferencia de electrones entre el citocromo b y el citrocomo c1, en el sitio oxidante ubiquinol. Controla las cepas patógenas resistentes a los inhibidores de la 14-desmetilasa y fenilamidas, las dicarboxamidas o bencimidazoles.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Enfermedad	Dosis	P.C.	P.R.
Arroz	Pudrición de la vaina *(Sarocladium orysae)*	1.75 Kgs/ha	32 días	12 horas
	Rhizoctonia *(Rhizoctonia solani kunh)*	1.5 Kgs/ha	32 días	12 horas
	Complejo manchado de grano	1.75 Kgs/ha	32 días	12 horas
	Mal del pie o mancha naranja (*Gaeumannomyces graminis)*	2.0 Kgs/ha	32 días	12 horas
	Añublo del Arroz (*Pyricularia grisae*)	2.0 Kgs/ha	32 días	12 horas
Papa	Tizón tardío *(Phytophthora infestans)*	1.5 – 1.8 Kgs/ha	7 días	12 horas
	Rhizoctonia (*Rhizoctonia solani* kunh)	1.5 Kgs/ha	7 días	12 horas
Rosa	Mildeo Velloso (*Peronospora sparsa*)	1.75- 2.0 Kgs/ha*	N.A.	4 horas

Maíz	Complejo mancha de asfalto (*Phyllacora maydis*, *Monographella maydis* y *Coniothyrium phyllacorae*.)	2.0 Kgs/ha	32 días	12 horas
Tomate**	Tizón tardío *(Phytophthora infestans)*	2.0 Kgs/ha	7 días	12 horas
Lulo				
Tomate de Árbol				
Uchuva				
Aji Dulce				
Ají				
Pimentón				
Tomate**	Tizón Temprano (*Alternaria Solani*)	2.0 Kgs/ha	7 días	12 horas
Tomate de Árbol				
Uchuva				
Aji Dulce				
Ají				
Lulo				
Pimentón				
Fresa**	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	2.0 Kgs/ha	7 días	12 horas
Arándano ojo de conejo				
Frambuesa				
Mora				
Brevo				
Uva				

P.C: Período de carencia. P.R: Período de reentrada
* Volumen de aplicación 1000 L/ha
**De acuerdo a la Resolución ICA No. 4754 del 7 de diciembre del 2011

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplique mediante aspersión foliar una sola vez por ciclo de cultivo o cosecha con el inicio de los primeros signos de la enfermedad, dentro de un programa de Manejo Integrado. En caso de requerirse más aplicaciones, rotar cada vez con fungicidas de diferente mecanismo de acción o grupo químico.

No aplique el producto si se espera lluvia una hora después de la aplicación, pues el nivel de control puede disminuir.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:

Use el volumen de agua requerido según el desarrollo del cultivo; use boquillas de cono hueco y un tamaño de gota fina (200 µm).

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos.

No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos se recomienda realizar pruebas previas.

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM ® Servicio 24 horas

Colombia
Teléfonos Fuera de Bogotá 01 800 0 916 012
En Bogotá: 2 88 60 12

Ecuador
1800 59 3005

Perú
080 050 847

Venezuela
0800 10 050 12

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:

Almacene el producto en su envase original etiquetado y cerrado, en un sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, y alejado de fuego o chispas.

Precauciones de uso:

Manténgase cerrado fuera del alcance de los niños.
Mantener separado de alimento, bebidas y alimento de animales.
Usar ropa protectora y guantes adecuados.
En caso de ventilación insuficiente, usar equipo respiratorio apropiado.
En caso de accidente o malestar, acuda al médico inmediatamente - mostrar la etiqueta si es posible.
Este producto y su empaque deben ser dispuestos como desechos peligrosos.
Evite derrames sobre el medio ambiente. Refiérase a la hoja de seguridad del producto.

Manejo de desechos y envases:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano o animal.
Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta el agua en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

PRIMEROS AUXILIOS:

Inhalación: Utilice equipo de protección respiratoria antes del rescate. Inmediatamente traslade la víctima a un lugar con aire fresco. Si la víctima no respira, dé respiración artificial; si respira dificultosamente, suminístrele oxígeno. Consiga atención médica.
Ingestión: En caso de intoxicación oral suministre una suspensión de 20-30 g de carbón activado en un vaso de agua e induzca al vómito si el paciente está consciente. Busque atención médica urgente.
Contacto con la piel: Remueva la ropa y zapatos contaminados inmediatamente. Lave fuertemente con agua y jabón la zona afectada. Consiga atención médica.

Contacto con los ojos: Lávelos con agua limpia por al menos 15 minutos hasta que la irritación disminuya. Consiga atención médica si la irritación persiste.
Nota para los médicos: No existe antídoto específico. Dar tratamiento sintomático, de descontaminación (lavado gástrico, suministro de carbón activado), y terapia de convulsiones.

CUIDADO
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO