



Dow AgroSciences

Goal™

480 SC

Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTE ACTIVO:

Oxyfluorfen: 2-chloro-a,a,a-trifluoro-p-tolyl 3-ethoxy-4-nitrophenyl ether. 480 g/l de formulación a 20°.

INGREDIENTES ADITIVOS: c.s.p. 1 litro

Registro de Venta ICA No.3801

Titular del Registro: Dow AgroSciences de Colombia S.A.

FABRICADO Y FORMULADO POR:

Dow AgroSciences LLC.
9330 Zionsville Road.
Indianapolis, IN 46268.
U.S.A.

DISTRIBUIDO POR:

Dow AgroSciences de Colombia S.A.

® TM Marca de The Dow Chemical Company
("Dow") o una compañía afiliada de Dow

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
MEDIANAMENTE TÓXICO
CUIDADO**



Dow AgroSciences

Goal™**480 SC****Etiqueta Web - Colombia****HERBICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC****INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO****“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”.**

Goal™ 480 SC es un herbicida pre-emergente recomendado en el control de malezas gramíneas, ciperáceas y de hoja ancha en cultivos de Arroz, Café, Yuca, Cebolla, Banano, Plátano y Palma Africana. Posee un largo efecto residual que permite mantener el cultivo limpio durante el período crítico de competencia de malezas. Puede así mismo aplicarse en post-emergencia temprana según lo indicado en la etiqueta para cada cultivo en particular.

CULTIVO	TRATAMIENTO	DOSIS	P.C.	P.R.
ARROZ	Goal™ 480 SC , se recomienda aplicarlo en PRE-EMERGENCIA TOTAL al cultivo y a las malezas entre 1 y 3 días después de la primera lluvia o riego de germinación. Tratamiento general.	0.5 - 0.75 l/ha. La dosis de 0.5 - 0.6 litros debe ser utilizada en suelos livianos y la de 0.75 litros en suelos pesados.	N/A	6 horas
ARROZ ROJO	Se recomienda aplicarlo en la última quema en mezcla con Glifosato. Esta dosis de Goal™ 480 SC tiene la capacidad de controlar el arroz rojo y variedades no deseables en el campo de arroz, además de dar residualidad a las malezas. Tratamiento general.	1.0 - 1.5 l/ha	N/A	6 horas
CAFÉ	Se recomienda en aplicación dirigida en bandas sobre surcos o en plateo, se puede realizar en pre-emergencia o post-emergencia temprana de las malezas.	1.5 - 2.0 l/ha establecido. 0.5 - 1.0 l/ha Almacigos. (30 - 40 cc / 20 L ó 300 - 400 cc / 200 L)	N/A	6 horas
YUCA	Se recomienda en aplicación dirigida en bandas sobre surcos, se puede realizar en pre-emergencia o post-emergencia temprana de las malezas.	1.5-2.0 l/ha (30 - 40 cc / 20 L ó 300 - 400 cc / 200 L)	N/A	6 horas
CEBOLLA DE BULBO Y RAMA	Se recomienda aplicar Goal™ 480 SC después de 5 días de efectuado el trasplante o deshije (cebolla de rama), en pre-emergencia o post-emergencia temprana de las malezas. Tratamiento general.	0.5 - 0.75 l/ha (250 cc / 200 L)	N/A	6 horas
BANANO Y PLÁTANO	Se recomienda en aplicación dirigida en plateo, se puede realizar en pre-emergencia o post-emergencia temprana de las malezas.	1.5 - 2.0 l/ha (30 - 40 cc / 20 L ó 300 - 400 cc / 200 L)	N/A	6 horas
PALMA AFRICANA	Se recomienda en aplicación dirigida en plateo, se puede realizar en pre-emergencia o post-emergencia temprana de las malezas.	1.5 - 2.0 l/ha (30 - 40 cc / 20 L ó 300 - 400 cc / 200 L)	N/A	6 horas





Dow AgroSciences

Goal™

480 SC

Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

P.C. Período de carencia.

P.R. Período de reentrada.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:

El **Goal™ 480 SC** se puede aplicar con los equipos convencionales que poseen boquilla Tee-Jet 80015, 8002, 8003 o equivalente TK-2.5, TK-3 o TK-5. Los tanques de preparación se deben lavar muy bien antes y después de preparar la mezcla del producto. Use agua limpia en volumen de 100-200 l/ha en aplicaciones de pre-emergencia en Arroz y de 400 a 600 l/ha en pre-emergencia o post-emergencia en cebolla de bulbo o rama. El volumen varía mucho en tratamientos dirigidos (Café, Yuca, Banano, Plátano y Palma Africana).

MALEZAS AUTORIZADAS QUE CONTROLA:

NOMBRE COMÚN DEL CULTIVO - NOMBRE CIENTÍFICO (ARVENSE) - NOMBRE COMÚN (ARVENSE):

ARROZ:

(*Digitaria sanguinalis*) Guardarocío, (*Echinochloa colonum*) Liendrepuerco, (*Rottboellia cochinchinensis*) Caminadora, (*Ischaemum rugosum*) Falsa caminadora, (*Eleusine indica*) Pata de gallina, (*Leptochloa filiformis*) Paja mona, (*Ipomoea* spp) Batatilla, (*Portulaca oleracea*) Verdolaga, (*Phyllanthus niruri*) Balsilla, (*Cyperus ferax*) Cortadera, (*Cyperus diffusus*) Cortadera.

ARROZ ROJO:

(*Oryza Sativa*) ARROZ ROJO.

CAFÉ:

(*Cenchrus echinatus*) Cadillo carretón, (*Eleusine indica*) Pata de gallina, (*Setaria geniculata*) Limpia frascos, (*Ipomoea* spp) Batatilla, (*Bidens pilosa*) Papunga, (*Sida* spp) Escoba, (*Cyperus ferax*) Cortadera, (*Cyperus diffusus*) Cortadera.

YUCA:

(*Cenchrus echinatus*) Cadillo carretón, (*Eleusine indica*) Pata de gallina, (*Setaria geniculata*) Limpia frascos, (*Amaranthus dubius*) Bledo, (*Euphorbia hirta*) Yerba de sapo, (*Ipomoea* spp) Batatilla, (*Portulaca oleracea*) Verdolaga, (*Sida* spp) Escoba, (*Cyperus ferax*) Cortadera, (*Cyperus diffusus*) Cortadera.

CEBOLLA DE BULBO Y RAMA:

(*Poa Annua*) Grama, (*Cenchrus echinatus*) Cadillo carretón, (*Amaranthus dubius*) Bledo, (*Ipomoea* spp) Batatilla, (*Portulaca oleracea*) Verdolaga, (*Emilia sonchifolia*) Hierba socialista, (*Sonchys* spp) Cerraja, (*Galinsoga ciliata*) Guasca, (*Malva* spp) Malva, (*Poligonum segetum*) Barbasco.





Dow AgroSciences

Goal™

480 SC

Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

BANANO Y PLÁTANO:

(*Cenchrus echinatus*) Cadillo carretón, (*Eleusine indica*) Pata de gallina, (*Setaria geniculata*) Limpia frascos, (*Amaranthus dubius*) Bledo, (*Euphorbia hirta*) Yerba de sapo, (*Ipomoea* spp) Batatilla, (*Portulaca oleracea*) Verdolaga, (*Sida* spp) Escoba, (*Cyperus ferax*) Cortadera, (*Cyperus diffusus*) Cortadera.

PALMA AFRICANA:

(*Cenchrus echinatus*) Cadillo carretón, (*Eleusine indica*) Pata de gallina, (*Setaria geniculata*) Limpia frascos, (*Amaranthus dubius*) Bledo, (*Euphorbia hirta*) Yerba de sapo, (*Ipomoea* spp) Batatilla, (*Portulaca oleracea*) Verdolaga, (*Sida* spp) Escoba, (*Cyperus ferax*) Cortadera, (*Cyperus diffusus*) Cortadera.

No controla malezas reproducidas vegetativamente como: Argentina (*Cynodon dactylon*), Siempre viva (*Commelina* spp), Achira (*Canna coccinea*) y Helecho (*Pteridium* spp).

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Una sola aplicación por ciclo, en pre-emergencia en el cultivo de arroz. En cebolla se pueden realizar varias aplicaciones por ciclo. En Café, Yuca, Banano, Plátano y Palma Africana en las cuales el tratamiento es dirigido, se recomienda repetir la aplicación cuando se presente reinfestación. Para un buen control al momento de la aplicación el suelo debe estar en buenas condiciones de humedad.

COMPATIBILIDAD Y TOXICIDAD:

En caso de duda realizar una prueba de compatibilidad.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.





Dow AgroSciences

Goal™

480 SC

Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**MANTÉNGASE BAJO LLAVE,
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Nocivo si se ingiere.

Causa irritación moderada a los ojos. Evitar contacto con piel y ropa.

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”.

No contamine aguas potables, de riego o para uso doméstico.

“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”.

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, medicamentos para uso humano o animal, ropas, fertilizantes, semillas, insecticidas o fungicidas.

“Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado”.

En caso de derrame, absorba y recoja con aserrín o tierra seca y entierre en sitio autorizado por la entidad de salud local. (ver teléfono de Emergencia Química).

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”

INGESTIÓN: NO INDUZCA EL VÓMITO A MENOS QUE EL MÉDICO INDIQUE LO CONTRARIO.

INHALACIÓN: Lleve el paciente al aire fresco.

NOTA AL MÉDICO: No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.

**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS
01 8000 916012 Fuera de Bogotá.**

En Bogotá comunicarse con el (091) 2886012

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Después de hacer la aplicación lave los equipos. Enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. No verter los residuos en fuentes de agua. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente. Evite contaminar con **Goal™ 480 SC** las aguas que vayan a ser utilizadas en consumo humano, animal o riego de cultivo.

ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.

**DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO,
ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE
Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA
MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO
INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O
PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO
EN EL LUGAR DESTINADO
POR LAS AUTORIDADES
LOCALES PARA ESTE FIN.**

Fecha aprobación ICA: 12 / 01 / 2011

