

FICHA TÉCNICA

Ivermectina Inyectable 1%

Registro ICA: 5091-DB



Presentaciones comerciales: Frascos por 50 y 500 mL.

Composición: Cada mL de solución inyectable contiene:

Ivermectina..... 10 mg

Excipientes c.s.p..... 1 mL

Las lactonas macrocíclicas, grupo farmacológico al cual pertenece la ivermectina, son medicamentos muy utilizados en medicina veterinaria para el control de parásitos internos y externos. Los fármacos endectocidas producen su efecto antiparasitario al incrementar la permeabilidad de la membrana celular para los iones cloro (Cl⁻), con la resultante hiperpolarización y parálisis de la musculatura faríngea y somática de los parásitos.

Indicaciones: IVERMECTINA INYECTABLE, es una solución inyectable indicada en bovinos y porcinos, para el tratamiento y control de endoparásitos (Parásitos internos) y ectoparásitos (Parásitos externos).

En bovinos:

Parásitos Gastrointestinales: Adultos y cuarto estado larvario de *Ostertagia ostertagi* (incluso las formas inhibidas), *Ostertagia lyrata*, *Hæmonchus placei*, *Mecistocirrus digitatus* (Adultos), *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Cooperia punctata*, *Cooperia pectinata*, *Bunostomum phlebotomum*, *Oesophagostomum radiatum*, *Nematodirus helvetianus* (Adultos), *Nematodirus spathiger* (Adultos), *Strongyloides papillosus* (Adultos), *Toxocara vitulorum* (Adultos). Aplicado en las dosis indicadas de 200 µg/kg. controla eficazmente las infestaciones de *Ostertagia* sp. y de *Cooperia* sp. adquiridas durante los siete días posteriores al tratamiento. **Parásitos Pulmonares:** Adultos y cuarto estado larvario de *Dictyocaulus viviparus*, incluyendo sus formas inhibidas. Aplicado en las dosis indicadas de 200 µg/kg., controla eficazmente las infestaciones de *Dictyocaulus viviparus* adquiridas durante los catorce días posteriores al

tratamiento. **Otros parásitos redondos:** Parafilaria bovicola, Thelazia sp. (Adultos). **Ectoparásitos:** Nuche: Dermatobia hominis. **Piojos:** Linognathus vituli, Hæmatopinus eurysternus, Solenoptes capillatus, Damalinia bovis (Ayuda en su control). **Ácaros de la sarna:** Psoroptes communis var. bovis, Sarcoptes scabiei var. bovis, Chorioptes bovis (Ayuda en su control). **Garrapatas:** Rhipicephalus microplus (Ayuda en su control).

En porcinos:

Parásitos Gastrointestinales: Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum sp., Strongyloides ransomi y Trichuris suis.

Parásitos Pulmonares: Metastrongylus sp. **Parásitos del Riñón:** Stephanurus dentatus. **Parásitos Externos: Piojos:** Hæmatopinus suis. **Ácaros de la sarna:** Sarcoptes scabiei var. suis.

Dosis y vías de administración:

Bovinos: 1 mL de producto por cada 50 kg de peso vivo, equivalente a 200 µg de Ivermectina / kg. Administrar únicamente por vía subcutánea.

Porcinos: 1 mL de producto por cada 33 kg de peso vivo, equivalente a 300 µg de Ivermectina / kg. Administrar únicamente por vía subcutánea.

EFFECTOS ADVERSOS Y TOXICIDAD: No deseche el producto o sus envases en fuentes de agua.

Tiempo de retiro:

Bovinos: Los bovinos tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento. No administrar a vacas en lactancia cuando la leche se destine a consumo humano. No administrar dentro de los 28 días anteriores al parto.

Porcinos: Los porcinos tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 28 días después de finalizado el tratamiento.

Precauciones:

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Consérvese en un lugar seco, fresco y protegido de la luz.

Consulte al Médico Veterinario.