

	Ficha Técnica			F-PDD-08
	Versión: 4	Aprobado por: Comité de calidad	Fecha de aprobación: 01-09-08	Página 1 de 3

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
1.1. Nombre comercial:	Kocide® 2000
1.2. Registro de venta ICA No.:	3806
1.3. Nombre Común:	Plaguicida de uso Agrícola
1.4. Tipo de Formulación:	Polvo soluble
1.5. Composición Garantizada:	INGREDIENTES ACTIVOS Hidróxido de Cobre.....53,8 %
1.6 Proceso de Fabricación o Formulación:	Sales de Cobre de alta concentración.
1.7. Presentación:	Empacado en bolsa de 1 kg.

2. MODO DE ACCIÓN:			
KOCIDE® 2000, es un fungicida y bactericida cúprico para el control de importantes enfermedades causadas por hongos y bacterias en cultivos.			
2.1. Recomendaciones de Uso y Manejo			
Cultivo	Enfermedad	Dosis grs/hl	Observaciones
Duraznero, Nectarino	Cáncer bacteriano (<i>Pseudomona Syringae</i> pv. <i>syringae</i>)	200 - 300	Después de caída de hojas como aplicación de dormancia.
	Cloca y Corineo (<i>Taphrina deformans</i> y <i>Wilsonomyces carpophilus</i>)	300 - 400	Aplicaciones en yema hinchada, antes de brotación, para proteger el follaje entre brotación y floración. Máximo 6 aplicaciones por temporada.
Frambueso	Antracnosis (<i>Elsinoeveneta</i>)	200 - 500	Comenzar las aplicaciones entre yema hinchada y brotación, repitiendo durante la temporada y post cosecha, dependiendo de la severidad de la enfermedad. Existen variedades sensibles al cobre. Máximo 6 aplicaciones por temporada.
	Tizón bacteriano (<i>Pseudomona Syringae</i> pv. <i>syringae</i>)	200 - 250	
Kiwi	Cáncer bacteriano (<i>Pseudomona Syringae</i> pv. <i>syringae</i>)	200 - 250	Dos a tres aplicaciones durante el receso invernal.
	Cáncer Europeo (<i>Nectria</i>	200 - 300	Aplicar 1 a 3 veces en Otoño, cuando haya caído 10%, 50%,



Ficha Técnica

F-PDD-08

Versión:
4

Aprobado por:
Comité de calidad

Fecha de aprobación:
01-09-08

Página 2 de 3

Manzano	galligena)		80% y 100% de las hojas, repetir en caso de lluvia.
	Ojo de Buey (<i>Neofabraea alba</i>)	160 - 200	Aplicar 15 días antes de cosecha para evitar infección de frutos. Máximo 3 aplicaciones por temporada.
Nogal	Peste Negra (<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>Juglandis</i>).	200 - 250	Aplicar con amentos recién expuestos, primeras flores pistiladas, 50% de flores pistiladas expuestas y nuez cuajada. Si fuera necesario repetir después de una lluvia. Máximo 6 aplicaciones por temporada.
Peral	Tizón bacteriano (<i>Pseudomona Syringae</i> pv. <i>syringae</i>)	200 - 300	Aplicar en yema hinchada, si fuera necesario repetir en floración en dosis no superiores a 100g/Hl.
Vid	Mildiú (<i>Plasmopara vitícola</i>)	250 - 300	Aplicar con brotes inferiores a 10 cms. Y repetir en tanto persistan lluvias en primavera. Evite aplicar en floración. Máximo 6 aplicaciones por temporada.
	Pudrición Ácida (<i>Rhizopus stolonifer</i>)	200 - 250	Aplicar 1 o 2 veces en forma preventiva entre pinta y cosecha.
Tomates	Peca bacteriana (<i>Pseudomona Syringae</i> pv. <i>tomato</i>) Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	300 - 500	Iniciar las aplicaciones con los primeros síntomas o cuando las condiciones sean predisponentes para estas enfermedades. Se recomienda repetir cada 7 días o según las condiciones. Máximo 4 aplicaciones por temporada.

	Ficha Técnica			F-PDD-08
	Versión: 4	Aprobado por: Comité de calidad	Fecha de aprobación: 01-09-08	Página 3 de 3

3. IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

- Se recomienda usar un volumen de agua que permita un buen mojado de las plantas: Volúmenes de agua mínimos sugeridos: Almendro, Damasco, Ciruelo y Cerezo 1500 - 2000 L/ha, Arándanos 1000 - 1500 L/ha; Limonero, Naranja 1000 - 1500 L/ha; Duraznero, Nectarino 1500 - 2000 L/ha; Kiwi 1000 L/ha; Manzana 1500 L/ha; Nogal 2000 - 2500 L/ha; Peral 1500 - 2000 L/ha; Vid 1000 - 1200 L/ha; Tomates 500 L/ha.
- El uso de **KOCIDE® 2000** mejora la eficacia de aplicación de agroquímicos y de fertilizantes foliares, evitando procesos de hidrólisis y floculación de los componentes en solución.

4. EFICACIA AGRONÓMICA Y COMPATIBILIDAD

4.1 COMPATIBILIDAD Compatible con la mayoría de los fungicidas e insecticidas actualmente en uso.

4.2 INCOMPATIBILIDAD No mezclar Fosetil Aluminio ni compuestos de aguda reacción ácida con KOCIDE® 2000. No debe usarse en soluciones con pH menores a 6,5.

4.3 REINGRESO AL ÁREA TRATADA Se recomienda esperar 24 horas después de la aplicación. No corresponde resguardo de reingreso para animales, porque los cultivos recomendados no están destinados a alimentación animal.

5. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Transporte: Producto NO regulado por las Naciones Unidas.

Almacenamiento : Mantenerlo en un lugar fresco, seco y con ventilación adecuada

Para mayor información consulte la hoja de seguridad **KOCIDE® 2000** (F-PRH-14)