

Seccion 2.

# MAGESTIC<sup>®</sup> 75% SP

Insecticida Agricola

POLVO SOLUBLE SP

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

### Ingrediente Activo:

Acefato = 0,S-dimetil -N- acetil fosforamidotoiato .....750 g/Kg

Ingredientes Aditivos .....c.s.p. 1 kilo

**REGISTRO DE VENTA ICA No. 3554**

**Titular del Registro: Arysta LifeScience Colombia S.A.**

**CONTENIDO NETO:** Bolsas por 200 y 500 gramos y Bolsas por 1 Kilo

**Fecha de Formulación:**

**Fecha de Vencimiento:**

**No. de Lote:**

**Importado por:** Arysta LifeScience



**Distribuido por:** Arysta LifeScience Colombia S.A.

Carrera 2 Este # 15 – 82 Barrio El Cortijo, Madrid, Cundinamarca

Tel: (57) 1 8250482. Fax: (57) 1 8252157. Colombia.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - MEDIANAMENTE TOXICO**

**CUIDADO**

Sección 1.

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION**

**MAGESTIC<sup>®</sup> 75% S.P.** es medianamente tóxico; sin embargo, se recomienda **“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”**. Es peligroso si se ingiere.

Durante las aplicaciones **“Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”** además, equipos de protección completos.

**“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”**.

**“Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado”**.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

No han sido determinados síntomas específicos. **“En caso de intoxicación llame al medico inmediatamente o lleve el paciente al medico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta”**.

**“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón”**.

**Ingestión:** Dar de beber agua o leche , antes de inducir el vómito Consulte a personal médico

**Inhalación:** Colocar al paciente en un lugar fresco y ventilado. Si no está respirando , dar respiración artificial preferiblemente de boca a boca. Si se respira con dificultad, suministrar oxígeno.

**ANTIDOTO**

**MAGESTIC<sup>®</sup> 75% SP**, es un inhibidor de la colinesterasa. El antídoto apropiado es la **ATROPINA** y el 2-PAM puede ser usado en unión con la **ATROPINA**, pero no debe ser aplicado sólo. Tómese un vaso de agua sal tibia como vomitivo y repítase el tratamiento hasta que el vómito sea claro.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 018000916012 Fuera de Bogotá.  
En Bogotá comunicarse con el Teléfono (57)1 2886012.

Sección 1. Continuación.

## **MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE**

No contamine fuentes de agua (canales de riego, lagos, lagunas, quebradas, ríos, cascadas, canales de drenaje, etc.) con los sobrantes de la aspersión.

Las áreas aplicadas no deben ser pastoreadas ni cosechadas, antes de que pase el PC (Intervalo de Seguridad entre la última aplicación y la cosecha).

## **ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO**

Mantenga el producto en sus envases originales en un lugar seguro, seco y fresco, **FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS, PERSONAS IRRESPONSABLES Y ANIMALES DOMESTICOS.**

No transporte ni almacene con productos de uso humano o pecuario.

Evite almacenar a temperaturas por encima de 35°C.

**NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.**

**DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCION EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILICELO TRITURANDOLO O PERFORANDOLO Y DEPOSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.**

**ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA PRIMERO ESTA ETIQUETA**

**Método de manejo de desechos:**

Siga las instrucciones de la etiqueta sobre manejo de los desechos generados por el uso del producto. En otras situaciones entierre los desechos o use un incinerador aprobado para la destrucción de plaguicidas. (Agencias de protección ambiental).

**“Para aplicación aérea y terrestre, respetar las franjas de seguridad de 100 y 10 metros respectivamente con relación a los cuerpos de agua”.**

Fecha de Aprobación ICA: 17/12/2012



## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

### RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA QUE CONTROLA	DOSIS - USO	P.C.*	P.R.** (horas)
Algodonero	<p>Primeras fases de desarrollo del cultivo:</p> <p>Gusano tierrero : (<b><i>Spodoptera frugiperda-Agrotis ipsilon</i></b>)</p> <p>Gusano tierrero (<b><i>Spodoptera frugiperda</i></b>)</p> <p>Trozadores (<b><i>Feltia sp</i></b>)</p> <p>Cucarroncitos del Follaje: (<b><i>Diabrotica sp</i></b>)</p> <p>Perforador de las hojas:(<b><i>Bucculatrix thurberiella</i></b>)</p> <p>Afidos (<b><i>Aphis gossypii</i></b>)</p>	<p><u>Tratamiento a las semillas:</u> 500 g de p.c. por cada 100 kg de semilla.</p>	N.A.	12
Algodonero <u>Plantas establecidas:</u>	<p>Falso bellotero: ( <b><i>Spodoptera frugiperda</i></b>)</p> <p>Gusano de las hojas: (<b><i>Alabama argillacea</i></b>)</p> <p>Falsos medidores: (<b><i>Trichoplusia ni - Pseudoplusia includens</i></b>)</p>	650 a 1300 gramos de p.c./ha	14 días	12

Maíz y Sorgo	<u>Tratamiento de semillas</u> Trozadores: ( <b><i>Spodoptera spp</i></b> ) T ierreros: ( <b><i>Agrotis ipsilon</i></b> ) Verraquito de tierra: ( <b><i>Neocutilla hexadactyla</i></b> ) Cucarrones de la raíz y el tallo. ( <b><i>Phyllophaga sp</i></b> )	500 g de p.c./100 kg de semillas.	21 días	12
Ajonjolí	Cogollero del maíz: ( <b><i>Spodoptera frugiperda</i></b> )  <u>Tratamiento de semillas:</u> Enrollador de las hojas : ( <b><i>Antigastra catalaunalis</i></b> )  <u>Cultivos establecidos</u> Enrollador de las hojas: ( <b><i>Antigastra catalaunalis</i></b> )	700 a 1250 g de p.c/ha  500 g de p.c./100 kg. de semilla  500 a 750 g de p.c./ha.	14 días  N.A.	12
Repollo	Gusano de las hojas ( <b><i>Leptophobia aripa</i></b> )	500 g de p.c./ha	14 días	12
Habichuela	Moscas blancas: ( <b><i>Bemisia tabaci - Trialeurodes vaporariorum</i></b> )	1.0 g de p.c/ litro de agua o 700 a 1000 g/ha.	14 días	12
<b>CULTIVO</b>	<b>PLAGA QUE CONTROLA</b>	<b>DOSIS - USO</b>	<b>P.C.*</b>	<b>P.R.**</b>
Tabaco	Pulguillas: ( <b><i>Epitrix sp</i></b> ) Chinche tatuadora, Palomilla o palometa: ( <b><i>Cypertopeltis tenuis</i></b> ) Minador de las hojas: ( <b><i>Phthorimaea operculella</i></b> )	800 a 1000 g de p.c./ha  500 g de p.c./ha	3 días	12
Cebolla	Minador o mosco: ( <b><i>Liriomyza spp</i></b> )	0.75 a 1.0 g de p.c./litro de agua. Se recomienda el uso de adherente para lograr mayor eficacia en el control.	14 días	12

Arroz	<u>Tratamiento de semillas:</u> Trozadores: <b>(Spodoptera spp)</b> Cucarrón: <b>(Eutheola bidentata)</b> Cucarrones de la raíz y el tallo: <b>(Phyllophaga sp)</b> Verraquito de tierra: <b>(Neocultilla hexadactyla)</b> Chinche de la Espiga <b>(Oebalus insularis)</b>	750 g de p.c./100 kg de semilla.  350 -500 gr/Ha	N.A.	N.A.  P.C.=21 días P.R.= 12
Papa (semilla)	Polilla Guatemalteca <b>(Tecia solanivora)</b>	3.5 g/ 250 cc de agua /Arroba  17.5 g / 1.5 litros de agua /Bulto  280 g/ 20 litros de agua / Tonelada	Se debe aplicar por aspersión de modo que se garantice el tratamiento a todos los tubérculos dejándolos secar antes de almacenarlos para semilla.	P.C.= 21 días P.R.= 12
Papa (campo)	Polilla Guatemalteca <b>(Tecia solanivora)</b>	500 gramos/Hectárea	<b>MAGESTIC 75 %<sup>®</sup> SP</b> debe ser utilizado con el debido asesoramiento técnico como un componente dentro de un programa de manejo integrado de la Polilla, que involucre control legal, cultural, etológico y biológico. La utilización del <b>MAGESTIC 75 %<sup>®</sup> SP</b> fuera de un manejo integrado no garantiza el control total de la plaga.	P.C.=21 días P.R.= 12
Rosa	Trips <i>Frankliniella occidentalis</i>	0,8 gr/l en 1500 L de agua por hectárea equivalente a 1,2 Kg/Ha		P.C.= N.A. P.R.** = 12 Horas después del secado total

Pastos	Collaria sp (Chinche de los pastos)	400g/Ha en 200 litros de agua	25 días después de la salida de pastoreo del ganado. Se recomienda el uso de MAGESTIC 75% SP (ACEFATO) para el control del chinche de los pastos (Collaria sp) en pastos, ya que disminuye la población de la plaga en una dosis de 400g/Ha, bajo condiciones de alta y baja población.	P.C.=21 días P.R.= 12
--------	--	-------------------------------	---	--------------------------

**P.C\*:** **Periodo de Carencia:** Días transcurridos entre la última aplicación y la cosecha. N.A.= No Aplica.

**P.R\*\*:** **Periodo de Reentrada:** El periodo de tiempo para el reingreso de los trabajadores a los lotes tratados es importante; se debe esperar entre 6 a 12 horas antes de su reingreso. N.A.= No Aplica.

## FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

**MAGESTIC® 75% S.P.** es un insecticida de acción sistémica para el control de una amplia gama de insectos plaga en varios cultivos de importancia económica.

## EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

Es necesaria una buena calidad de la aspersión. Los tanques de preparación se deben lavar muy bien antes y después de preparar la mezcla de producto.

## COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

**MAGESTIC® 75% S.P.** es compatible con la mayoría de los plaguicidas, sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad. En caso de duda consulte con un Ingeniero Agrónomo. Aplicado a las dosis recomendadas no presenta síntomas de fitotoxicidad en los cultivos

## INFORMACION SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del registro garantiza que las recomendaciones físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

