2º. Cuerpo.

MANCOL ® 80 WP

FUNGICIDA AGRICOLA

POLVO MOJABLE WP

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

Mancozeb:
Manganese ethylenebis (dithiocarbamate) (polymeric)
Complex with zinc salt 800 gramos por kilo

Ingredientes Inertes:
c.s.p..... 1 Kilo

REGISTRO DE VENTA ICA No 3530

Titular del Registro: Arysta LifeScience Colombia S.A.

CONTENIDO NETO: Bolsas por 500 gramos y Bolsas por 1, 5, 10 y 25 Kilos

Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:
No. de Lote:

Importado y Distribuido por: **Arysta LifeScience Colombia S.A.**
Carrera 2 Este # 15 – 82 Barrio El Cortijo, Madrid, Cundinamarca
Tel: (57) 1 8250482. Fax: (57) 1 8252157. Colombia.

Arysta LifeScience

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - MEDIANAMENTE TOXICO

CUIDADO

Sección 1.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

MANCOL ® 80 WP es medianamente tóxico; sin embargo, se recomienda "**No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación". Es peligroso si se ingiere.**

Durante las aplicaciones "**Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas"** además, equipos de protección completos.

"Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón".

"Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado".

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

No han sido determinados síntomas específicos. **"En caso de intoxicación llame al medico inmediatamente o lleve el paciente al medico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta".**

"En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón".

Ingestión: Dar de beber agua o leche, antes de inducir el vómito Consulte a personal médico

Inhalación: Colocar al paciente en un lugar fresco y ventilado. Si no está respirando, dar respiración artificial preferiblemente de boca a boca. Si se respira con dificultad, suministrar oxígeno.

ANTIDOTO
No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.
No suministrar leche u otras sustancias que contengan grasas animales o vegetales, ya que éstas pueden incrementar la absorción del tóxico.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 018000916012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono (57)1 2886012.

Sección 1. Continuación.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

No contamine fuentes de agua (canales de riego, lagos, lagunas, quebradas, ríos, cascadas, canales de drenaje, etc.) con los sobrantes de la aspersión.

Las áreas aplicadas no deben ser pastoreadas ni cosechadas, antes de que pase el PC (Intervalo de Seguridad entre la última aplicación y la cosecha).

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Mantenga el producto en sus envases originales en un lugar seguro, seco y fresco, **FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS, PERSONAS IRRESPONSABLES Y ANIMALES DOMESTICOS.**

No transporte ni almacene con productos de uso humano o pecuario.

Evite almacenar a temperaturas por encima de 35°C.

NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCION EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILICELO TRITURANDOLO O PERFORANDOLO Y DEPOSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA PRIMERO ESTA ETIQUETA

Fecha de Aprobación ICA: 26/05/2009



Sección 3.

INSTRUCCIONES DE USO

Aplique **MANCOL ® 80 WP** en mezcla con un volumen suficiente de agua para cubrir uniformemente el follaje de las plantas. Use equipo aéreo o terrestre. Para preparar la mezcla llene con agua el tanque hasta la mitad, agregue el fungicida agitando continuamente, agregue el agua resultante del triple lavado del envase desocupado y después añada el resto del agua, manteniendo la agitación.

RECOMENDACIONES Y DOSIS

CULTIVO	Nombre Común	Nombre Científico	P.C. *	Dosis en g por 200 l de agua ó Kg/Ha
TOMATE	Gota o tizón tardío Antracnosis Mancha de la hoja Mancha septorial ó Viruela del tomate	*Phytophthora infestans* *Colletotrichum phomoides* *Stemphylium solani* *Septoria lycopersici*	14	450 g de p.c. en 200 l de agua a intervalos de 7 días. En casos severos haga aplicaciones cada 4 a 5 días.
TRIGO, CEBADA	Mancha común Mancha Reticular Escaldado de la hoja Roya de la hoja	*Helminthosporium sativum* *Helminthosporium teres* *Rhynchosporium secalis* *Puccinia hordei*	26 5-7	1.5 a 2.5 kg de p.c./ha. Para una caneca de 200 l use 500 g.
ARROZ	Pudrición del cuello Mancha lineal Mancha circular	*Pyricularia oryzae* *Cercospora oryzae* *Helminthosporium oryzae*	10	4.0 kg de p.c./ha. Utilizar un volumen de mezcla de 60 a 80 l para helicópteros y aviones respectivamente.
BANANO Y PLATANO	Sigatoka	*Cercospora musae*		2 kg de p.c. en mezcla con aceite de aspersión agrícola. Consulte a los técnicos.
CITRICOS	Mancha negra	*Phoma sp.*	7	250 g de p.c. en 200 l de agua.
PAPA	Gota o tizón tardío	*Phytophthora infestans*		1,35 kg/ha, equivalentes a 450 g de p.c. en 200 l de agua.
FRIJOL, ARVEJA	Roya	*Uromyces phaseoli*	4	450 g de p.c. en 200 l de agua. (2.5 kg de p.c./Ha).

CULTIVO	Nombre Común	Nombre Científico	P.C. *	Dosis en g por 200 l de agua ó Kg/Ha
CEBOLLA DE BULBO y CEBOLLA DE RAMA, AJO	Mildeo velloso Mancha púrpura Añublo de la hoja	*Peronospora destructor* *Alternaria porri* *Botrytis allii*	7	500 g de p.c. en 200 l de agua (2.5 kg de p.c./Ha).
MELON, PEPINO, CALABAZA	Mildeo velloso Antracnosis Roña ó sarna	*Pseudoperonospora cubensis* *Colletotrichum lagenarium* *Cladosporium cucumerinum*	7	450 g de p.c. en 200 l de agua. (2.5 kg de p.c./Ha). Dirija la aspersión al envés de las hojas principalmente.
LECHUGA	Mildeo velloso	*Bremia lactucae*	7	450 g de p.c. en 200 l de agua. (2.5 kg de p.c./Ha).
AJI-PIMIENTO	Antracnosis Podredumbre	*Gloeosporium piperatum* *Colletotrichum gloeosporoides*	14	450 g de p.c. en 200 l de agua. (2.5 kg de p.c./Ha).
BERENJENA	Gota Antracnosis	*Phomopsis vexans* *Gloeosporium melongenae*	7	450 g de p.c. en 200 l de agua.
COLES, REPOLLO COLIFLOR	Mildeo velloso Mancha foliar Antracnosis	*Peronospora parasitica* *Alternaria spp.* *Colletotrichum spp.*	14	450 g de p.c. en 200 l de agua.
REMOLACHA	Mancha foliar	*Cercospora beticola*	7	450 g de p.c. en 200 l de agua.
CRISANTEMO	Moho gris Tizón Mancha foliar	*Botrytis cinerea* *Ascochyta spp.* *Septoria chrysanthemella*		450 g de p.c. en 200 l de agua.
VID	Mildeo velludo Mancha foliar parda Podredumbre amarga Podredumbre negra	*Plasmopara viticola* *Elsinoe ampelina* *Melanconium fuligeneum* *Guignardia bidwellii*	14	550 a 750 g de p.c. por 200 l de agua dando una completa cobertura.
MANI	Mancha foliar	*Cercospora arachidicola*	7	550 a 750 g de p.c. por 200 l de agua.
ROSA	Mancha foliar	*Diplocarpon rosae*		450 g de p.c. en 200 l de agua.
CAFETO	Mancha de hierro	*Cercospora coffeicola*	7	500 g de p.c. en 200 l de agua.

P.C*: Periodo de Carencia: Días transcurridos entre la ultima aplicación y la cosecha. N.A.= No Aplica.

P.R: Periodo de Reentrada:** El periodo de tiempo para el reingreso de los trabajadores a los lotes tratados es importante; se debe esperar 24 horas antes de su reingreso. **N.A**.= No Aplica.

Sección 3. Continuación.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

MANCOL ® 80 WP es un fungicida de acción de contacto para el control de una amplia gama de de hongos en cultivos de importancia económica.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

Es necesaria una buena calidad de la aspersión. Los tanques de preparación se deben lavar muy bien antes y después de preparar la mezcla de producto.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

No es fitotoxico a las dosis recomendadas en ésta etiqueta. No mezcle **MANCOL ® 80 WP** con otros plaguicidas, surfactantes o fertilizantes hasta no haber efectuado una prueba de compatibilidad y seguridad al cultivo. Agítese bien antes de usarse.

INFORMACION SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

"El Titular del registro garantiza que las recomendaciones físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendaos, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".