

OXITETRACICLINA 50 ERMA



Laboratorio:



Uso terapéutico: ANTIMICROBIANO

Principio Activo: OXITETRACICLINA

Especies:



OXITETRACICLINA 50 ERMA es un antibiótico

Composición	Contenido
Oxitetraciclina clorhidrato	50 mg
Excipientes cs	1 ml

- **ACCIÓN:** Antimicrobiano

- **INDICACIONES:** Potente antibiótico para el tratamiento de enfermedades infecciosas ocasionadas por gérmenes sensibles a la oxitetraciclina.
- **DOSIS:** 5 mg. por cada kg. de peso. En la práctica, 10 ml. por cada 100 kg. de peso vivo.
Para el tratamiento de anaplasmosis: 10 mg./kg.; en la práctica 20 ml./100 kg. de peso vivo cada 12 horas durante 5 días consecutivos. Lavados uterinos: Diluir 2 g. (40 ml.) de oxitetraciclina en 50-100 ml. de agua destilada estéril. Vías de administración: Intramuscular, intravenosa, subcutánea, intraperitoneal o intrauterina.
- **TIEMPO DE RETIRO:** 21 días para carne. 6 días para leche.
- **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:** Uso Veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños.
- **PRESENTACIÓN:** Frasco por 10, 50, 100, 250 y 500 mL
- **REGISTRO ICA:** 1733 DB