



Persist* 500 SC

Fungicida Agrícola

Suspensión Concentrada SC

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTE ACTIVO:

Mancozeb:	462 g/l
Cymoxanil:	63.4 g/l

INGREDIENTES ADITIVOS :c.s.p. 1 Kilo

REGISTRO NACIONAL ICA No. 0110

TITULAR DEL REGISTRO:

Dow AgroSciences de Colombia S.A.



Dow AgroSciences

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR:

Dow AgroSciences de Colombia S.A.

Transversal 18 No. 96-41 Piso 7°.

Bogotá (091) 219 6000 Soledad - Atlántico (095) 375 9300

*Marca Registrada de Dow AgroSciences LLC

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Persist* 500 SC es un fungicida de contacto y sistémico, con acción preventiva y de post-infección cuando el hongo está en incubación, indicado para el control de enfermedades causadas por hongos del género *Phytophthora*, en los cultivos de papa, tomate y rosas. Además posee actividad sistémica local, lo cual mejora su efecto, especialmente en períodos de alta presión de la enfermedad.

MODO DE PREPARACIÓN:

Preparación de la mezcla: Disolver completamente la cantidad de **Persist* 500 SC** a ser usada en un balde, luego depositarla en el tanque de mezcla que contenga agua hasta $\frac{3}{4}$ o la mitad de su capacidad. Completar el volumen total de agua y agitar para homogenizar la mezcla.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	P.C.	P.R.
PAPA	Gota o Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	500 cc/ha en un volumen de agua de 200 l/ha. Comenzar las aplicaciones desde la emergencia del cultivo y cuando existan condiciones para el desarrollo de la enfermedad.	1 día	24 horas
TOMATE	Gota o Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	500 cc/ha en un volumen de agua de 200 l/ha. Comenzar las aplicaciones desde la emergencia del cultivo y cuando existan condiciones para el desarrollo de la enfermedad.	1 día	24 horas
ROSAS	Mildeo vellosa (<i>Peronospora sparsa</i>)	2 cc/ha en un volumen de agua de 1 l/ha. Aplicar el producto en la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad y cuando se presenten o existan condiciones para su desarrollo	1 día	24 horas

P.C. Período de Carencia

P.R. Período de reentrada

L.M.R. en Papa y Tomate: 0.05

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se puede aplicar durante toda la temporada del cultivo y el intervalo de la aplicación depende de la presión de la enfermedad.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Evite el contacto con agentes oxidantes, ácidos y bases fuertes. No es fitotóxico para los cultivos, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Nocivo si se ingiere.

Evite el contacto con los ojos, piel y ropa.

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”.

No contamine aguas potables, de riego o para uso doméstico.

“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”.

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, medicamentos para uso humano o animal, ropas, fertilizantes, semillas, insecticidas o herbicidas.

“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”.

Evite que la mezcla caiga o sea acarreada por el viento sobre plantas útiles sensibles al Mancozeb y al Cymoxanil. Pequeñas cantidades pueden causarles daños severos. Absténgase de realizar aplicaciones aéreas en las inmediaciones de estos cultivos.

Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.

En caso de derrame, absorba y recoja con aserrín o tierra seca y entierre en sitio autorizado por la entidad de salud local. (ver teléfono de Emergencia Química).

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta. **“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”**

INGESTIÓN: NO INDUZCA EL VÓMITO A MENOS QUE EL MÉDICO INDIQUE LO CONTRARIO.

INHALACIÓN: Lleve el paciente al aire fresco.

NOTA AL MÉDICO: No existe antídoto específico. Es conveniente un lavado gástrico.

**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS 01 8000 916012 Fuera de Bogotá.
En Bogotá comunicarse con el (091) 2886012**

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente. No utilice el mismo equipo de fumigación para aplicar **Persist* 500 SC** en la aplicación de otro plaguicida, en cultivos susceptibles o para bañar ganado. Evite contaminar con **Persist* 500 SC** las aguas que vayan a ser utilizadas en consumo humano, animal o riego de cultivo. Tenga en cuenta la franja de seguridad y la regulación dada por el ICA.

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

