

FICHA TÉCNICA

PHYVERMEC-EQUI

Pasta oral

USO VETERINARIO

COMPOSICIÓN:

Cada 100 g de pasta oral contiene:

Ivermectina.....	1,87 g
Excipientes c.s.p.....	100 g

DESCRIPCIÓN:

La Ivermectina es un derivado de las avermectinas, pertenecientes a la familia de las lactonas macrocíclicas.

PHYVERMEC-EQUI es eficaz contra una gran variedad de nemátodos y ectoparásitos, pero sin acción contra cestodos ni tremátodos.

Incrementa la actividad del receptor GABA (como agonista) generando parálisis muscular en el parásito. Útil para el tratamiento de *Strongylus sp*, *Gasterophilus*, *Onchocera*, *Onchocerca spp.*, áscaris, piojos, pulgas, garrapatas.

INDICACIONES:

PHYVERMEC-EQUI, está indicado en equinos para el tratamiento y control de endoparásitos y ectoparásitos de los equinos incluyendo: *Strongylus vulgaris*, *Strongylus edentatus*, *Strongylus westeri*, *Oxyuris equi*, *Parascaris equorum*, *Trichonstrongylus axei*, *Habronema microstoma*, *Habronema muscae*, *Habronema megastoma*, *Gasterophilus intestinalis* y *Dyctiocaulus arnfieldi*. Para el tratamiento y control de ectoparásitos que incluyen *Dermatobia hominis*. **Larvas:** *Cochliomyia hominivorax*. **Piojos:** *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurytenuis*. **Microfilarias:** *Onchocera sp* y *Draschia sp*.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Vía de administración: administrar por vía oral.

Depositar la dosis en la parte posterior y encima de la lengua, levantando la cabeza del caballo durante unos

segundos mientras pasa o deglute el producto. La frecuencia del tratamiento de acuerdo al criterio del Médico Veterinario.

DOSIS:

La jeringa de 6,42 g es suficiente para un equino de 600 Kg, la mitad de la jeringa para un equino de 300 Kg. Administrar 200 µg de ivermectina por kg de peso vivo.

PRECAUCIONES:

No administrar a yeguas en gestación.

SEGURIDAD AMBIENTAL:

No eliminar en fuentes de agua ya que puede resultar tóxico para peces y otros organismos acuáticos. Los envases y residuos del producto deberán ser eliminados de acuerdo a lo establecido con la normatividad medio ambiental vigente del país.

CONSERVESE EN UN LUGAR SECO, FRESCO Y PROTEGIDO DE LA LUZ.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

VENTA BAJO FÓRMULA DEL MÉDICO VETERINARIO.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

USO VETERINARIO.

TIEMPO DE RETIRO:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 14 días después de finalizado el tratamiento.

Presentación comercial: Jeringa por 6,42 g.

Registro ICA No. 5672-DB

- **Bibliografía:**

1. Sumano, H. Farmacología Veterinaria. 2006. Cap. 9, Pág. 279-281.
2. www.drugs.com/vet/ivermectin-liquid-for-horses-can.html