

Sección 2.

## PROFENOCRON

INSECTICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE EC

COMPOSICION GARANTIZADA :

**INGREDIENTES ACTIVOS :**

**Profenofos:**..... 500 gr/L

De 0-4 bromo-2-clorofenil 0-etil S-propil fosforotioato, de formulación a 20<sup>o</sup> C.

**INGREDIENTES ADITIVOS:**

csp, 1,0 litro

REGISTRO NACIONAL ICA No. 0018

Titular del Registro: Arysta LifeScience Colombia S.A.

CONTENIDO NETO: 250 cc y 1, 4, 10 y 20 litros

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento

No. de Lote

Formulado Por: Arysta LifeScience China. Arysta LifeScience 1110-111,11th floor lipro plaza 222 hja-ha rdad (m) Shangai CHINA

Importado y Distribuido por: Arysta LifeScience Colombia S.A.

Carrera 2 Este # 15 – 82 Barrio El Cortijo, Madrid, Cundinamarca

Tel: (57) 1 8250482. Fax: (57) 1 8252157. Colombia.



Arysta LifeScience

CATEGORÍA TOXICOLOGICA II (FRANJA DE COLOR AMARILLO PANTONE C)  
MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO  
SIMBOLO DE EQUIX

Sección 2.

## PROFENOCRON

INSECTICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE EC

COMPOSICION GARANTIZADA :

**INGREDIENTES ACTIVOS :**

**Profenofos:**..... 500 gr/L

De 0-4 bromo-2-clorofenil 0-etil S-propil fosforotioato, de formulación a 20 ° C.

**INGREDIENTES ADITIVOS:**

csp, 1,0 litro

REGISTRO NACIONAL ICA No. 0018

Titular del Registro: Arysta LifeScience Colombia S.A.

CONTENIDO NETO: 250 cc y 1, 4, 10 y 20 litros

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento

No. de Lote

Formulado Por: **SINOCHEM NINGBO CHINA**. 21 JIAGXIA ST., NINGBO 315000 CHINA. Tel. 86-574-87348868  
Fx. 86-574-87366775. Mail. nbchem@sinochem-nb.com. **CHINA**

**Importado y Distribuido por: Arysta LifeScience Colombia S.A.**

Carrera 2 Este # 15 – 82 Barrio El Cortijo, Madrid, Cundinamarca

Tel: (57) 1 8250482. Fax: (57) 1 8252157. Colombia.



Arysta LifeScience

**CATEGORÍA TOXICOLOGICA II (FRANJA DE COLOR AMARILLO PANTONE C)**  
**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**  
**SIMBOLO DE EQUIX**

Sección 2.

## PROFENOCRON

INSECTICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE EC

COMPOSICION GARANTIZADA :

INGREDIENTES ACTIVOS :

Profenofos:..... 500 gr/L

De 0-4 bromo-2-clorofenil 0-etil S-propil fosforotioato, de formulación a 20 ° C.

INGREDIENTES ADITIVOS:

csp, 1,0 litro

REGISTRO NACIONAL ICA No. 0018

Titular del Registro: Arysta LifeScience Colombia S.A.

CONTENIDO NETO: 250 cc y 1, 4, 10 y 20 litros

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento

No. de Lote

Formulado Por: BIESTERFELD SHANGAI CO., Ltd CHINA. Unit 906-07. Harbour Ring Plaza  
18 Xi Zang Road (M), Shanghai 200001, CHINA Tel. 86-21-53852290 / 53852297 Fax 86-21-53852296

Importado y Distribuido por: Arysta LifeScience Colombia S.A.

Carrera 2 Este # 15 – 82 Barrio El Cortijo, Madrid, Cundinamarca

Tel: (57) 1 8250482. Fax: (57) 1 8252157. Colombia.



Arysta LifeScience

CATEGORÍA TOXICOLOGICA II (FRANJA DE COLOR AMARILLO PANTONE C)  
MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO  
SIMBOLO DE EQUIX

Sección 2.

## PROFENOCRON

INSECTICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE EC

COMPOSICION GARANTIZADA :

INGREDIENTES ACTIVOS :

Profenofos:..... 500 gr/L

De 0-4 bromo-2-clorofenil 0-etil S-propil fosforotioato, de formulación a 20 ° C.

INGREDIENTES ADITIVOS:

csp, 1,0 litro

REGISTRO NACIONAL ICA No. 0018

Titular del Registro: Arysta LifeScience Colombia S.A.

CONTENIDO NETO: 250 cc y 1, 4, 10 y 20 litros

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento

No. de Lote

Formulado Por: HANSEANDINA CHINA (HANSEASIA LIMITED) 3905 Two Exchange Square,  
8 Connaught Place, Central, Hong Kong Telephone: + 852 8197 4467

Email: info@hanseasi.hk CHINA

Importado y Distribuido por: Arysta LifeScience Colombia S.A.

Carrera 2 Este # 15 – 82 Barrio El Cortijo, Madrid, Cundinamarca

Tel: (57) 1 8250482. Fax: (57) 1 8252157. Colombia.



Arysta LifeScience

CATEGORÍA TOXICOLOGICA II (FRANJA DE COLOR AMARILLO PANTONE C)  
MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO  
SIMBOLO DE EQUIX

## Sección 1.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

**MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION**

**CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS**

**CAUSA IRRITACIÓN A LA PIEL**

**EL CONTACTO PROLONGADO O REPETIDO PUEDE CAUSAR REACCIONES ALERGICAS A CIERTAS PERSONAS**

**PROFENOCRON<sup>®</sup>**, es altamente tóxico cuando se ingiere; se recomienda **“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”**.

Durante las aplicaciones **“Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas”** además, equipos de protección completos.

**“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”**.

**“Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado”**.

Por ser inflamable, manténgase alejado de fuentes de calor o de llamas descubiertas.

## **INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

**Ingestión:** Tómese un vaso de aguasal hasta producir el vómito. Repita el tratamiento hasta que este sea claro. Nunca de de comer o beber a una persona en estado de inconciencia.

**Inhalación:** Remueva al paciente a un lugar fresco. Si se respira con dificultad suministrar oxígeno o pedir atención médica.

**Contacto:** **“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón”**. Causa irritación moderada en los ojos.

Atropina en combinación con PAM o TOXOGONIN. **LLAME INMEDIATAMENTE AL MEDICO.**

**NOTA:** Nunca suministre nada oral a un paciente inconsciente.

**Nota para el Médico:** Inyecte por vía intravenosa de 2 – 4 mg (adultos) sulfato de Atropina. Repítalo en intervalos de 5 – 10 minutos, hasta que aparezcan los síntomas de atropinización. El paciente debe ser atropinado por 24-48 horas, debido a la posible reabsorción del veneno. Si se aplica no más tarde de 12 horas después de la intoxicación puede ser también útil la inyección de preparaciones de Oxima.

**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 018000916012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono (57)1 2886012.**

Sección 1. Continuación.

### **MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE**

No contamine fuentes de agua (canales de riego, lagos, lagunas, quebradas, ríos, cascadas, canales de drenaje, etc.) con los sobrantes de la aspersión.

Las áreas aplicadas no deben ser pastoreadas ni cosechadas, antes de que pase el PC (Intervalo de Seguridad entre la última aplicación y la cosecha).

**Derrames:** recójalos con algún material absorbente (por ejemplo aserrín), colóquelos en una bolsa plástica y deposítelos en un sitio adecuado (evitando contaminar fuentes de agua, cultivos o zonas habitadas) y disponga de ellos técnicamente.

“Por ser altamente toxico a abejas este producto no debe ser aplicado en cultivos florecientes ni debe ser utilizado en situaciones en las cuales la abeja pueda estar en contacto directo”

“Toxico para abejas”. y “ No aplicar en presencia de polinizadores”.

**“Para aplicación aérea y terrestre, respetar las franjas de seguridad de 100 y 10 metros respectivamente con relación a los cuerpos de agua”.**

### **ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO**

Mantenga el producto en sus envases originales en un lugar seguro, seco y fresco, **FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS, PERSONAS IRRESPONSABLES Y ANIMALES DOMESTICOS.**

No transporte ni almacene con productos de uso humano o pecuario.

Evite almacenar a temperaturas por encima de 35° C.

**NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.**

**DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCION EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILICELO TRITURANDOLO O PERFORANDOLO Y DEPOSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.**

Fecha de Aprobación ICA: 23/10/2012



### Sección 3.

#### ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

#### GENERALIDADES

**PROFENOCRON**®, Es un insecticida del grupo químico de los organofosforados

Aunque no presenta acción sistémica, su efecto translaminar (en profundidad) es considerable. **PROFENOCRON**®, Es absorbido por los foliares relativamente rápido, lo cual disminuye los riesgos de lavado por lluvia. Su rápida degradación (metabolización) en el tejido foliar permite tratamientos hasta de 10 a 14 días antes de la cosecha sin presentar riesgos de residuos que sobrepasen los límites establecidos.

#### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

Cultivo	Plagas	Dosis P.C. cc/L	P.C. *	P.R.**
Clavel	Araña Roja : <i>Tetranychus cinnabarinus</i>	0,9 cc P.C. / L	No Aplica	12 horas

\* **PC**= Período de carencia: Ultima aplicación antes de la cosecha (días).

\*\***P.R**= Periodo de Reentrada: 12 Horas.

#### COMPATIBILIDAD EN MEZCLA DE TANQUE:

**PROFENOCRON**®, Es compatible en mezcla de tanque con la mayoría de los insecticidas, acaricidas y fungicidas de uso corriente. No obstante es indispensable realizar previamente un ensayo de compatibilidad.

#### FITOCOMPATIBILIDAD:

**PROFENOCRON**®, Usado de acuerdo a las instrucciones es fitocompatible con los cultivos recomendados en esta etiqueta.

#### AVISO DE GARANTIA

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

