PROTEUS® OD

- **Dispersión oleosa OD**
- **Insecticida agrícola**
- **Reg. Nacional ICA 313**
- **Titular del Registro Bayer CropScience S. A.**

Composición garantizada:
Ingredientes activos:
Thiacloprid:……150 g/L de formulación a 20 ℃
Deltametrina:……20 g/L de formulación a 20 ℃
Ingredientes aditivos:……c.s.p. 1 litro

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Precauciones y advertencias de uso y aplicación:
- Causa irritación en los ojos.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar el polvo, o aspersión.
- Utilizar ropa de protección adecuada al manipular, aplicar el pro- ducto; y para ingresar al área tratada durante las primeras 6 horas (guantes, botas, visor, overol, delantal).
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de aplicar el producto báñese con abundante agua y jabón, lave la ropa contaminada.
- No permita animales en el área tratada.
- Los equipos de aplicación deben ser previamente calibrados.

Almacenamiento:
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No reenvase el producto.
- No almacenar en casas de habitación. Almacene el producto en sitios seguros retirados de alimentos y medicinas de consumo humano y animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco, seco y ventilado).
- Transpórtelo solamente con productos agroquímicos, NO con productos de consumo humano y animal.

Primeros auxilios:
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele esta etiqueta adjunta.
- En caso de ingestión, si la persona está consciente induzca el vómito y de a beber una suspensión de 20 – 30 g de carbón activado en 150 – 200 mL de agua.
- En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por mínimo 15 minutos, cubra el ojo afectado y lleve el paciente al médico.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y bañe al paciente con abundante agua y jabón y lleve al médico.
- En caso de intoxicación por inhalación, retire la víctima de la zona de contaminación, lleve al aire libre y mantenga al paciente acostado de medio lado y vigile que éste respire.

Bayer CropScience una división de Bayer S. A.
Línea 01 8000 111 212
Bogotá, D.C., Colombia
® Marca Registrada

Guía para el médico:
• Medidas de descontaminación general. Tratamiento sintomático.

Medidas para la protección del medio ambiente:
• En caso de derrame, recoger con materiales absorbentes (aserrín o tierra seca), guardarlo en bolsa plástica y/o caneca y deseche acorde con la entidad local competente.
• No asperjar áreas fuera del cultivo a tratar. Lave el equipo en el sitio de la aplicación y deseche esta agua en el área tratada.
• No contaminar lagos, ríos, estanques ni arroyos con desechos o envases vacíos.
• Tóxico para abejas. No aplicar en presencia de polinizadores. Aplicar temprano en la mañana o al final de la tarde.

Se prohíbe la utilización de este envase para contener. Alimentos o agua para consumo. Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, evitando salpicadu- ras. Luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, DERRAME O INCENDIO COMUNICARSE CON CISPROQUIM: Línea 01 8000 916012 ATENCIÓN 24 HORAS O EN BOGOTÁ AL Tel.: (091) 2 88 60 12.
LÍNEA BAYER CROPSCIENCE DE SERVICIO AL CLIENTE: 01 8000 111212.

Instrucciones de uso y manejo:
CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO. AGITELO ANTES DE DESTAPAR Y USAR EL PRODUCTO

Generalidades:
PROTEUS® OD es un insecticida con acción de contacto, estomacal y con propiedades sistémicas y actúa uniéndose en forma postsináptica a los receptores nicotinérgicos y afectando el canal del sodio en el sistema nervioso.
***** Periodo entre la última aplicación y el reingreso del ganado 25 días.
1 P.C. Periodo de carencia: Tiempo entre la última aplicación y la cosecha o el reingreso del ganado al lote.
2 P.R. Periodo de reentrada: 6 horas siempre y cuando la superficie foliar esté seca. Es un periodo restringido (no prohibido) entre la aplicación y la re-entrada del personal al área aplicada, siempre verifique que la superficie foliar este seca. Si requiere realizar alguna labor antes de cumplirse el periodo de re-ingreso (ej. monitoreo de la aplicación), debe utilizar overol, botas y guantes.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: PROTEUS® OD debe ser apli- cado de acuerdo al monitoreo de la plaga, susceptibilidad de la varie- dad y condiciones ambientales, dentro de un programa de rotación con otros insecticidas de diferente mecanismo de acción, siguiendo las re- comendaciones del Comité de Prevención de Resistencia a Insecticidas IRAC y complementando con prácticas de manejo integrado de cultivo. En el cultivo de arroz se recomienda utilizar la dosis más alta cuando la presencia de los chinches sea en etapa vegetativa.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Antes de realizar mezclas con **PROTEUS® OD** debe realizarse previamente pruebas de miscibilidad y fitocompatibilidad en pequeña escala.
PROTEUS® OD en las dosis y frecuencia recomendadas, es compatible con los cultivos registrados, sin embargo, se recomienda pruebas de fitocompatibilidad con nuevas variedades y/o híbridos.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del re- gistro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

PRESENTACIONES: 200 cc, 1 litro y 5 litros.

DAÑINO

Categoría toxicológica: II MODERADAMENTE PELIGROSO

Bayer CropScience una división de Bayer S. A.
Línea 01 8000 111 212
Bogotá, D.C., Colombia
® Marca Registrada