



Dow AgroSciences

Rally™

40 WP

Etiqueta Web - Colombia

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTE ACTIVO:

Myclobutanil: 400 g/kg
alfa-butil-alfa-(4-clorofenil)-1H-1,2,4-triazol-1-propanonitrilo de formulación a 20°.

INGREDIENTES ADITIVOS: c.s.p. 1 kg

Registro de Venta ICA No. 2697

Titular del Registro: Dow AgroSciences de Colombia S.A.

FABRICADO POR:

Dow AgroSciences LLC
Indianápolis Indiana
USA

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Diagonal 92 No. 17A - 42
Bogotá (57 1) 2196000

® TM Marca de The Dow Chemical Company
("Dow") o una compañía afiliada de Dow

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
MEDIANAMENTE TÓXICO
CUIDADO**

Rally™

40 WP

Etiqueta Web - Colombia

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Rally™ 40 WP es un nuevo fungicida sistémico con propiedades protectoras y curativas contra una gama amplia de hongos. **Rally™ 40 WP** se absorbe rápidamente en las hojas, protege los brotes nuevos y controla al hongo hasta 4 días después de haberse iniciado la infección. Tiene un efecto residual de 14 a 21 días.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Adicione la dosis total del **Rally™ 40 WP** al tanque con la mitad del agua y continúe agregando agua con buena agitación para lograr la suspensión del producto. En caso de mezclas con otros fungicidas, insecticidas, se deben hacer pruebas previas de compatibilidad.

Para mejorar la cobertura se recomienda el uso de **Kaytar™ ACT SL** al 0.25% v/v.

Se debe esperar hasta que la aspersión seque completamente antes de entrar en el cultivo.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	P.C.
TOMATE	Tizón temprano <i>Alternaria Sp.</i>	0,2 a 0,4 gramos de p.c/litro de agua ó 40-80 gramos de p.c. por caneca de 200 litros.	1 día
CEBOLLA CABEZONA	Mancha púrpura <i>Alternaria porri</i>	40 gramos de p.c. por caneca de 200 litros.	3 días
VID	Oidium o mildew polvoso <i>Uncinula necator</i>	50 a 125 gramos de p.c/ha, aplicando en rotación con un fungicida con base de azufre, a partir de los 40 días después de la poda.	14 días
ROSAS	Oidium <i>Sphaerotheca pannosa</i>	7.5 a 15 gramos de p.c./100 litros de mezcla ó 0.15 g/l.	n/a
BANANO	Pudrición de corona <i>Fusarium moniliforme</i> <i>F. semitectum</i> , <i>Gloeosporium sp</i>	150, 400 a 600 p.p.m., para envíos de fruta a Norteamérica (7 días), Europa (14 días) y Países Orientales (21 días), respectivamente.	n/a
FRÍJOL	Antracnosis o Mancha anillada <i>Colletotrichum lindemuthianum</i>	40 gramos/200 l de agua de manera preventiva o cuando las condiciones ambientales lo exijan.	1 día
ARROZ	Escaldado de la hoja <i>Rhynchosporium oryzae</i>	50 a 75 gramos de p.c./ha (aplique a la aparición de los primeros síntomas).	1 día
ARROZ	Pudrición de la vaina <i>Sarocladium oryzae</i>	50 a 75 gramos de p.c./ha (aplicar en pleno embuchamiento).	1 día





40 WP

Etiqueta Web - Colombia

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	P.C.
ARROZ	Helminthosporiasis <i>Helminthosporium oryzae</i>	50 a 75 gramos de p.c./ha (aplique a la emisión de la espiga y/o 10 a 14 días después).	1 día
ARROZ	Complejo Manchado de grano	75 gramos de p.c./ha (aplique a la emisión de la espiga y/o 10 a 14 días después).	1 día
AGUACATE	Antracnosis <i>Colletotrichum gloesporoides</i>	40 gramos de p.c./200 litros de agua ó 80 gramos / ha.	1 día

P.C. Período de Carencia

Período de reentrada: Espere a que la aplicación se haya secado. En banano no aplica por ser un producto aplicado al fruto antes de empacar.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Depende de las condiciones ambientales y de la aparición de las enfermedades.

TOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD:

No se han registrado daños a los cultivos cuando se usan las dosis recomendadas. Si se van a realizar mezclas, se recomienda realizar previamente pruebas de compatibilidad en áreas pequeñas. No es compatible con los que contengan cal.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.





Dow AgroSciences

Rally™

40 WP

Etiqueta Web - Colombia

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**MANTÉNGASE BAJO LLAVE,
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Nocivo si se ingiere.

Evite el contacto con los ojos, piel y ropa.

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”.

No contamine aguas potables, de riego o para uso doméstico.

“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”.

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, medicamentos para uso humano o animal, ropas, fertilizantes, semillas, insecticidas o herbicidas.

“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”.

Pequeñas cantidades de producto pueden causar daños severos a plantas sensibles a Myclobutanil. Absténgase de realizar aplicaciones aéreas en las inmediaciones de estos cultivos. Mantenga las franjas de seguridad establecidas para aplicaciones aéreas y terrestres.

Conservar el producto en el empaque original etiquetado y cerrado.

En caso de derrame, absorba y recoja con aserrín o tierra seca e incinere en horno especificado para tal fin. (Ver teléfono de Emergencia Química).

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”.

INGESTIÓN: NO INDUZCA EL VÓMITO A MENOS QUE EL MÉDICO INDIQUE LO CONTRARIO.

INHALACIÓN: Lleve el paciente al aire fresco.

NOTA AL MÉDICO: No existe antídoto específico. Es conveniente un lavado gástrico.

**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS
01 8000 916012 Fuera de Bogotá.**

En Bogotá comunicarse con el (091) 2886012

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente. No utilice el mismo equipo de fumigación para aplicar **Rally™ 40 WP** en la aplicación de otro plaguicida, en cultivos susceptibles o para bañar ganado.

Evite contaminar con **Rally™ 40 WP** las aguas que vayan a ser utilizadas en consumo humano, animal o riego de cultivo. Tenga en cuenta la franja de seguridad que es de 10 m para aplicación terrestre y 100 m para aplicación aérea y la regulación dada por el ICA.

ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.

**DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO,
ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE
Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA
MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO
INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O
PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO
EN EL LUGAR DESTINADO
POR LAS AUTORIDADES
LOCALES PARA ESTE FIN.**

Fecha aprobación ICA: 28 / 09 / 2011

