

REGENT® 200 SC



- Suspensión concentrada - SC
- Insecticida agrícola
- Phenylpyrazole
- Reg. de venta. ICA 2244
- Titular del Registro Bayer S. A.

Composición garantizada:

Ingrediente activo:

Fipronil: $(\pm)$ -5-amino-1-(2,6-dicloro-a, a, a,-trifloro-p-tolyl)-4-trifluoro -3- carbonitrilo: 200 g/L por litro de formulación a 20 °C.

Ingredientes aditivos:.....c.s.p. 1 litro

Generalidades:

REGENT® 200 SC es un insecticida que corresponde al grupo químico Fenil Pirazoles. Actúa por contacto e ingestión presentando una excelente actividad biológica sobre insectos perforadores, chupadores y masticadores.

FIPRONIL actúa sobre el sistema nervioso de los insectos, más específicamente el compuesto es activo sobre el canal GABA, regulador del cloro. Insectos resistentes o tolerantes a los piretroides, ciclodienos y organofosforados, no tienen resistencia cruzada al FIPRONIL, siendo **REGENT® SC** un producto efectivo para los programas de manejo de resistencia.

CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO. AGÍTESE ANTES DE USAR.

Cultivo	Plaga	Dosis Época	1P.C	2P.R.
Algodón	Picudo <i>Anthonomus grandis</i>	325 - 350 mL3/ha efectuar las aplicacio- nes cuando los daños por alimentación y/o oviposición sean del 20%	20 días	6 horas
Arroz	Cucarro <i>Euetheola bidentata</i> Minador de la hoja <i>Hidrellia</i>	300 - 350 mL3/ha: Aplicar entre los 8 y 20 días de germinado el cultivo y se observe presencia importante de adultos en el campo	30 días	
	Marranita <i>Gryllotalpa hexadactyla</i>	250 - 275 mL3/ha: Aplicar a la aparición de los primeros ataques de la plaga		
	Chinche del Hedor <i>Oebalus sp.</i>	250 - 300 cm3/ha. Aplicar a la aparición de los primeros ataques de la plaga, en estado de grano lechoso		
Papa	Gusano blanco <i>Premnotrypes vorax</i>	0.6 L/ha ó 240 mL/200 litros agua Aplicar a la base de la planta en inicio de germinación, aporque y maduración	20 días	
Cebolla Cabezona	Thrips <i>Thrips tabaci</i>	0.6 L/ha o 240 cm3 por caneca de 200 litros	20 días	
Cebolla Larga				
Cebolla Puerro				
Cebollín				
Pastos	Chinche de los pastos <i>Collaria spp</i>	100 - 150 mL/ha	25 días*	

P.C.: Tiempo entre la última aplicación y la cosecha.

P.R.: **Periodo de reentrada:** periodo restringido (no prohibido) entre la aplicación y la re-entrada del personal al área aplicada, siempre verifique que la superficie foliar este seca. Si requiere realizar alguna labor antes de cumplirse el periodo de re-ingreso (ej. monitoreo de la aplicación), debe utilizar overol, botas y guantes.

* Periodo entre la última aplicación y el reingreso del ganado 25 días

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Letal si es inhalado, no respire (polvo, vapor o aspersión).
- Evite el contacto con la piel y la ropa.
- Utilizar ropa de protección adecuada al manipular, aplicar el pro- ducto; y para ingresar al área tratada durante las primeras 6 horas. (Guantes, botas, visor, overol, delantal).
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de aplicar el producto báñese con abundante agua y jabón, lave la ropa contaminada.
- No permita animales en el área tratada.
- Los equipos de aplicación deben ser previamente calibrados.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No re-envase el producto.

Bayer CropScience una división de Bayer S. A.
Línea 01 8000 111 212
Bogotá, D.C., Colombia
® Marca Registrada

- No almacenar en casas de habitación. Almacene el producto en sitios seguros retirados de alimentos y medicinas de consumo humano y animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco, seco y ventilado).
- Transpórtelo solamente con productos agroquímicos, NO con productos de consumo humano y animal

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta adjunta.
- En caso de ingestión, Si el paciente está consciente, dele una cucharada de jarabe de Ipecacuana para inducir el vómito. Si no vomita en 20 minutos, repita la dosis de jarabe una vez más; NO haga vomitar a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua por mínimo 15 minutos, cubra el ojo afectado y lleve al paciente al médico.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y bañe al paciente con abundante agua y jabón y lleve al médico.
- En caso de intoxicación por inhalación, retire la víctima de la zona de contaminación, lleve al aire libre y mantenga al paciente acostado de medio lado y vigile que éste respire. Si no respira utilice la respiración artificial.

GUÍA PARA EL MÉDICO:

- Medidas de descontaminación general. Tratamiento sintomático.
- Siempre debe tenerse en mente la posibilidad de exposición a otros agentes. El manejo específico comprende control de las convulsiones con: diazepam 10 a 30 g según el peso, por vía intravenosa, esta dosis será repetida cada 10 a 30 minutos acorde a la respuesta del paciente; o fenobarbital 50 a 100 mg vía I.V., y debe ir acompañado de las medidas usuales de descontaminación, como el lavado gástrico y la inducción de catarsis salina. Los síntomas de intoxicación con fipronil son revertidos rápidamente por el tratamiento.
- El tratamiento debe continuarse durante varios días, disminuyendo gradualmente la dosis del anticonvulsivante, basado en la repuesta clínica del paciente. Esto es necesario debido a la lenta eliminación del compuesto.
- NO se debe administrar atropina, ni oximas regeneradoras de colinesterasa, a menos que se sospeche intoxicación concomitante con organofosforados o carbamatos. Los opiáceos, la adrenalina y la aminofilina se contraindican.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- En caso de derrame, recoger con materiales absorbentes (aserrín o tierra seca), guardarlo en bolsa plástica y/o caneca y deseche acorde con la entidad local competente.
- No asperjar áreas fuera del cultivo a tratar. Lave el equipo en el sitio de la aplicación y deseche esta agua en el área tratada
- No contaminar lagos, ríos, estanques ni arroyos con desechos o envases vacíos.
- Tóxico a abejas. No aplicar en presencia de abejas ó polinizadores ó cerca de enjambres. Preferible aplicar temprano en la mañana o al final de la tarde
- Si existen apiarios cercanos informe previamente al apicultor
- Respetar las franjas de seguridad en relación a cuerpos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, o cualquier otra área que requiera protección especial, 10 metros (terrestre) y 100 metros (área)

Después de usar el contenido, enjuague el envase tres veces y vacíe el agua de lavado en la mezcla de aplicación, evitando salpicaduras. Los envases, empaques o embalajes desocupados se deberán destruir de manera que queden inservibles y su eliminación final deberá ser la aprobada por la respectiva autoridad local.

Se prohíbe la utilización de este envase para contener alimentos o agua para consumo

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A: EN CASO DE DERRAME O INCENDIO COMUNICARSE CON CISPROQUIM: Línea 01 8000 916012. ATENCIÓN 24 HORAS. O EN BOGOTÁ AL TEL: (091) 288 60 12.
LÍNEA BAYER CROPSCIENCE DE SERVICIO AL CLIENTE: 01 8000 111212. CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Bayer CropScience una división de Bayer S. A.
Línea 01 8000 111 212
Bogotá, D.C., Colombia
® Marca Registrada

COMPATIBILIDAD: REGENT® 200 SC es compatible con la mayoría de los insecticidas utilizados convencionalmente en estos cultivos. Sin embargo, se recomienda antes de efectuar mezclas, hacer pruebas de compatibilidad con el insecticida que se desea mezclar.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD: El fabricante garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para los fines aquí recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo.

PRESENTACIONES: 1 litro y 240 cc.

CUIDADO

Categoría toxicológica: III MEDIANAMENTE TÓXICO