

RHAPSODY



BIOFUNGICIDA USO AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada SC

Registro de Venta ICA No. 5798

A NOMBRE DE BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Ingrediente activo:

Bacillus subtilis, raza (QTS 713) 1 x 10⁹ ufc/g 1.34%

Ingredientes aditivos:

AUXILIARES DE FORMULACIONc.s.p. 100%

Contiene 13.40 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial equivalente a 1×10¹²

PRIMEROS AUXILIOS

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Contacto Accidental: se deben lavar bien las manos o las partes contaminadas con suficiente agua y jabón, si aparece irritación avisar al médico.

Por Ingestión. Suministre grandes cantidades de agua e induzca el vómito, sólo si el paciente está consciente. Llame inmediatamente al médico o lleve al paciente al médico.

Por contacto con la piel. Remueva la ropa contaminada con el producto y lave con abundante agua y jabón durante 15 minutos.

Por contacto con los ojos. Abra los párpados y lave los ojos durante 30 minutos con abundante agua, si la irritación persiste, lleve el paciente al médico.

Por inhalación. Lleve la persona a un lugar fresco y ventilado, si persiste alguna molestia consulte con un médico.

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Los síntomas de intoxicación pueden ser: cefalea, somnolencia, vértigo, inconsciencia, náuseas, vómitos e irritación de mucosas.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE EL PACIENTE AL MEDICO Y MUÉSTRELE UNA COPIA DE LA ETIQUETA”

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

RHAPSODY® 1.34 SC debe conservarse en su envase original herméticamente cerrado; almacénalo en lugares secos, libres de humedad. No almacenarlo en casas de habitación.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR:

CISPROQUIM: Línea de información para atención de emergencias con productos químicos (24 horas) 01-8000-916012 y 2886012

“NINGUN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO BIOFUNGICIDAS DEBERA UTILIZARSE PARA CONSERVAR ALIMENTOS O AGUA POTABLE”. “DESPUES DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE

TRES (3) VECES ESTE ENVASE Y VIERTA EL AGUA EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN. LUEGO DESTRUYALO.”

RECOMENDACIONES DE USO

RHAPSODY® 1.34 SC presenta múltiples modos de acción para invadir y atacar hongos fitopatógenos. Trabaja primero creando una zona de inhibición en la hoja, previniendo el ataque de patógenos.

RHAPSODY® 1.34 SC también detiene el crecimiento de los patógenos por competencia por los nutrientes y espacio en la superficie de la hoja.

RHAPSODY® 1.34 SC destruye el tubo germinativo y el micelio del patógeno, estos diferentes modos de acción resultan en un efectivo control de las enfermedades, con muy poca posibilidad de que los patógenos desarrollen resistencia.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

Cultivo	Plaga que controla	Dosis (Lt/Ha)	EPOCA Y NUMERO DE APLICACIONES
Tomate	Gota <i>Phitophthora Infestans</i>	2.5 - 10 cm3/Litro	Realizar aplicaciones periódicas con los primeros síntomas de la enfermedad con intervalos de 7 días entre ellas.
Rosa	Mildeo Polvoso <i>Sphaerothec a pannosa</i>	5 -10 cm3/Litro	Iniciar aplicaciones cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad realizando una aplicación semanal.

COMPATIBILIDAD

RHAPSODY® 1.34 SC No debe mezclarse con productos plaguicidas, surfactantes o fertilizantes foliares sin antes realizar una prueba de compatibilidad.

ADVERTENCIA

“El Fabricante garantiza que las características físico – químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante registro oficial de venta, se verificó que es apto para los fines aquí recomendados, de acuerdo con las condiciones de empleo”.

CATEGORÍA TOXICOLOGICA II: ALTAMENTE TÓXICO

Bayer CropScience una división de Bayer S. A.

Línea 01 8000 111212

Bogotá, D.C., Colombia

® Marca Registrada