

FICHA TÉCNICA

RIDODUR 80 WP (MANCOZEB)

pag. No. 1

- Presentaciones:** bolsas de Kilo y 25 Kg.
- Grupo químico:** etilen bisditiocarbamato
- Nombre químico:** Complejo de manganeso etilenobis ditiocarbamato (polimérico) con sal de zinc (mancozeb).
- Fórmula Empírica:** (C₄ H₆ N₂ S₄ Mn x) Zn y
- Formulación:** polvo mojable. (Fungicida)
- Categoría toxicológica:** CATEGORIA III (banda Azul)
- Modo de acción:** Fungicida protector de amplio espectro, actúa en forma preventiva, es absorbido por las plantas, actúa por contacto y tiene acción protectora para los varios cultivos.

Recomendaciones de uso

CULTIVOS	ENFERMEDADES	Dosis g P.C. / Ha
* PAPA <i>Solanum tuberosum</i>	GOTA - <i>Phytophthora infestans</i>	400 - 500 Disuelto en 200 L de agua
PAPA SEMILLA <i>Solanum tuberosum</i>	Desinfección	450 g/100 L de agua
ARROZ <i>Nicotiana tabacum</i>	Afublo, bruzone o pudrición del cuello Mancha lineal Mancha circular o Helminthosporiasis - <i>Piricularia oryzae</i> - <i>Cercospora oryzae</i> - <i>Colletotrichum spp.</i>	Usar de 60 a 80 L/Ha de mezcla para avioneta y helicóptero respectivamente.
CEBOLLA <i>Allium cepa</i> AJO <i>Allium sativum</i>	Mildiu vellosa Mancha púrpura Afublo de la hoja - <i>Peronospora destructor</i> - <i>Alternaria porri</i> - <i>Botrytis spp.</i>	500 g / 200 L de agua Agregue 120 cm ³ de un adherente /200 L de mezcla
TOMATE <i>Lycopersicon esculentum</i>	Tizón tardío - <i>Phytophthora infestans</i>	450 - 600 g/200 L de agua
ROSA <i>Rosa spp.</i>	Mancha negra - <i>Diplocarpon rosae</i>	Aplique 450 g/200 L de agua cada 7 a 14 días
BANANO PLÁTANO	Sigatoka Podredumbre - <i>Cercospora musae</i> - <i>Colletotrichum capsici</i>	2 Kg en combinación con 4 - 10 L de aceite de aspersión cada 15 a 20 días según necesite.
CAFÉ	Mancha de Hierro - <i>Cercospora coffeicola</i>	250 / 199 L de agua en almácigos cada 10 a 15 días.
CÍTRICOS	Mancha negra - <i>Poma citricarpa</i>	450 g/200 L de agua
COL. REPOLLITAS DE BRUSELAS, COLIFLOR, BRÓCOLI.	Mildiu vellosa Mancha foliar Antracnosis - <i>Peronospora parasitica</i> - <i>Alternaria spp.</i> - <i>Colletotrichum spp.</i>	450 g/200 L de agua (2.1 Kg/Ha). Agregue 120 cm ³ de un adherente por cada 200 L de mezcla.
FREJOL ARVEJA	Roya o polvillo Mildeo vellosa Antracnosis - <i>Uromyces phaseoli</i> - <i>Erysiphe polygoni</i> - <i>Colletotrichum lindemuthianum</i>	450 g/200 L de agua a los primeros síntomas y en antracnosis cuando empiece floración.
MELÓN <i>Cucumis melo</i>	Mildeo velludo - <i>Pseudoperonospora cubensis</i>	450 g/200 L de agua.
PIMIENTO AJÍ	Antracnosis Podredumbre - <i>Gloeosporium piperatum</i> - <i>Colletotrichum capsici</i>	450 g/200 L de agua. Aplique al formarse los frutos.
PIÑA	Pudrición del corazón - <i>Phytophthora spp</i>	500 a 1000 g/200 L de agua

Licencia ICA Número: 4091

Importado y Distribuido por: Agroproductiva S.A.

