

SERENADE



AGENTE MICROBIAL PARA CONTROL DE ENFERMEDADES

USO AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA SC

REGISTRO DE VENTA ICA No. 5973

COMPOSICION GARANTIZADA

Ingredientes Activo:

Bacillus subtilis, cepa (QST 713) 1×10^9 ufc/g 1.34%

Ingredientes Aditivos:

AUXILIARES DE FORMULACION c.s.p. 100%

Contenido neto: 200 Litros

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

RECOMENDACIONES DE USO

SERENADE® 1.34 SC presenta múltiples modos de acción para invadir y atacar hongos fitopatógenos. Trabaja primero creando una zona de inhibición en la hoja.

Previene el ataque de patógenos destruyendo el tubo germinativo y el micelio del hongo. Estos diferentes modos de acción resultan en un efectivo control de las enfermedades, con muy poca posibilidad de que los patógenos desarrollen resistencia.

SERENADE® 1.34 SC detiene la germinación de esporas brindando un muy buen efecto protectante. Por su modo y mecanismo de acción se presenta como una herramienta ideal de rotación y manejo de resistencia dentro de un programa de manejo de enfermedades. SERENADE® 1.34 SC brinda un efecto sinérgico con triazoles y estrobilurinas.

Cultivos	Plaga que controla	Dosis (Lt/Ha)	EPOCA Y NUMERO DE APLICACIONES
Banano	SIGATOKA NEGRA (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	1.0 Litro/Ha	Iniciar aplicaciones cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad realizando una aplicación cada quince días.
Arroz	AÑUBLO DE LA VAINA (<i>Rhizoctonia solani</i>)	1.5 - 2.0 Litro/Ha	Aplice el 50% del producto 20 días después de la emergencia, y el 50% restante 15 días después.

PC (Periodo de carencia) – No aplica

PR (Periodo de reentrada): Al secar el follaje

Banano: Se recomienda SERENADE 1.34 SC para el control de Sigatoka negra (*Mycosphaerella fijiensis*) en mezcla con fungicidas sistémicos como Triazoles, Morfolinas, Estrobirulinas y carboxamidas para banano convencional, Agregue SERENADE® 1.34 SC de último cuando se ha logrado la emulsión.

Mezcla de Serenade SC en emulsión Aceite-Agua-Sistémicos

1. Colocar la dosis recomendada de aceite en el tanque de mezcla.
2. Agregar emulsificante, se debe utilizar de acuerdo con la recomendación del técnico (0.5%-1 .0%). Agitar durante tres minutos.
3. Adicionar del agua (18 a 23 L/ha). Agitar la mezcla 5 minutos
4. Adicionar la dosis recomendada de Sistémico. Agitar la mezcla por un minuto.
5. Adicionar la dosis recomendada de Serenade SC. Agitar la mezcla por un minuto.
6. Adicionar & 50% de la cantidad necesaria de agua restante para ajustar el volumen final (18 a 23 L/ha). Agitar la mezcla 5 minutos.

Arroz: Aplique SERENADE® 1.34 SC para el control de *Rhizoctonia solani* de manera preventiva en aplicaciones parciales de 15-20 días después de emergido el arroz o cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad a los 35 días después de emergencia. En caso de alta presión de la enfermedad en el cultivo se recomienda emplear SERENADE 1.34 SC en mezcla con fungicidas sistémicos para aumentar su espectro de control, Los mejores resultados se obtienen con la mezcla de SERENADE® 1.34 SC más triazoles y/o estrobilurinas en aplicaciones fraccionadas.

COMPATIBILIDAD: SERENADE® 1.34 SC no debe mezclarse con plaguicidas, surfactantes o fertilizantes foliares sin antes realizar una prueba de compatibilidad.

ADVERTENCIA

“El Fabricante garantiza que las características físico – químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante registro oficial de venta, se verificó que es apto para los fines aquí recomendados, de acuerdo con las condiciones de empleo”.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO ACCIDENTAL: se deben lavar bien las manos o las partes contaminadas con suficiente agua y jabón, si aparece irritación avisar al médico.

Por Ingestión. Suministre grandes cantidades de agua e induzca el vómito, sólo si el paciente está consciente. Llame inmediatamente al médico o lleve al paciente al médico.

Por contacto con la piel. Remueva la ropa contaminada con el producto y lave con abundante agua y jabón durante 15 minutos.

Por contacto con los ojos: Abra los párpados y lave los ojos durante 30 minutos con abundante agua, si la irritación persiste, lleve el paciente al médico.

Por inhalación. Lleve la persona a un lugar fresco y ventilado, si persiste alguna molestia consulte con un médico.

SINTOMAS DE INTOXICACION:

Los síntomas de intoxicación pueden ser: cefalea, somnolencia, vértigo, inconsciencia, náuseas, vómitos e irritación de mucosas.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE EL PACIENTE AL MEDICO Y MUÉSTRELE UNA COPIA DE ESTA ETIQUETA”

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

SERENADE® 1.34 SC debe conservarse en su envase original herméticamente cerrado; almacénelo en lugares secos, libres de humedad. No almacenarlo en casas de habitación.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR:

CISPROQUIM: Línea de información para atención de emergencias con productos químicos (24 horas) 01-8000-916012 y 2886012

“NINGUN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO BIOFUNGICIDAS DEBERA UTILIZARSE PARA CONSERVAR ALIMENTOS O AGUA POTABLE”.

“DESPUES DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES (3) VECES ESTE ENVASE Y VIERTA EL AGUA EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN. ENTREGUE EL ENVASE VACIO Y CON TRIPLE LAVADO A LA CORPORACION CAMPO LIMPIO.”

Categoría toxicológica: II ALTAMENTE TÓXICO CUIDADO

Fabricado por:

AgraQuest, Inc.

1540 Drew Avenue, Davis, CA 95616-6320-EEUU

Tel 530.750.0150- Fax 530.750.0153

y

AgraQuest de Mexico. S.A. de C.V.

Autopista San Martin Texmelucan-Tlaxcala km 6.5

San Felipe Ixtacuixtla, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Tlaxcala, C.P. 901020 Tel 01 (248) 484 3738

Bayer CropScience una división de Bayer S. A.

Línea 01 8000 111212

Bogotá, D.C., Colombia

® Marca Registrada