

FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-A-034
PRODUCTO TERMINADO TRILLA 800 SC.	
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 1
I+D AGROQUÍMICOS	FECHA: 15/Dic/2011

1. NOMBRE

TRILLA 800 SC

2. DESCRIPCIÓN

El producto **TRILLA 800 SC** es un herbicida que tiene como ingrediente activo el Diurón en una concentración del 80.0 % peso/volumen , en forma de suspensión concentrada.

3. CARACTERÍSTICAS

TRILLA 800 SC. es un herbicida perteneciente al grupo de las Ureas , granulado humectable, para control tanto selectivo como total de malezas , de acción sistémica, de aplicación en pre-emergencia y post-emergencia y de baja volatilidad; recomendado para el control de malezas de hoja ancha en cultivos de caña de azúcar . Aplicado en las dosis recomendada no es venenoso para el ganado ni destruye los pastos debido a su selectividad.

4. ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICA DE CALIDAD: ESPECIFICACION

ASPECTO FÍSICO: Líquido viscoso blanco o ligeramente gris.

VISCOSIDAD: 60,0 – 100,0 KU

CONTENIDO DE DIURON: 775,0 - 825,0 gramos/litro.

pH: 6,0 – 8,0

TAMAÑO DE PARTÍCULA: menor de 10 um.

DENSIDAD: 1,230 - 1,300 g/ml.

SUSPENSIBILIDAD: Mayor del 80,00 %

5. APLICACIONES Y USOS

Preparación de la mezcla : Llene el tanque de la mezcla hasta 1/4 de su capacidad con agua , comience a agitar , adicione **TRILLA 800 SC** según la cantidad que vaya a preparar y complete el nivel de agua . Adicione **Potenzol 900** en una dosis de 0,2 a 0,5 % v/v para incrementar la efectividad del ingrediente activo , también se puede mezclar con INVESAMINA 480 SL para aumentar su espectro en maleza de hoja ancha.



SC 5819-1



SA 136-1



OS 211437



Responsabilidad Integral®
Compromiso Social y Ambiental
con el Desarrollo Sostenible

Recomendaciones de Uso

CULTIVO	OBJETIVO BIOLÓGICO	DOSIS	PERIODO DE REINGRESO	PERIODO DE CARENIA
CAÑA DE AZÚCAR	<i>Control de malezas de hoja ancha</i> <i>Batatilla (Ipomoea sp)</i> <i>Yerba socialista (Emilia sonchifolia sp)</i> <i>Dormidera (Mimosa pudica)</i> <i>Chilinchil (Cassia tora)</i> <i>Verdolaga (Portulaca oleracea)</i> <i>Frijolillo (Phaseolus lathyroides)</i> <i>Archucha (Momordica dubius)</i> <i>Bledo (Amaranthus dubius)</i> <i>Yerba de sapo (Euphorbia hirta)</i> <i>Golondrina (Euphorbia hypericifolia)</i> <i>Control de malezas de hoja angosta</i> <i>Paja mona (Leptochloa filiformis)</i> <i>Pata de gallina (Eleusine indica)</i>	3.0-3.5 L/ha Aplicado en Preemergencia al Cultivo*	24 horas	N.A.

*Aplicar en condiciones de humedad del suelo

NOTA :. En aplicaciones terrestres usar un volumen de mezcla de 200 Lt/ha para conseguir un buen cubrimiento y control.

TRILLA 800 SC debe aplicarse en época de lluvias o en presencia de humedad adecuada , las aplicaciones en épocas secas no son tan efectivas ; cuando se cometan errores en las aplicaciones y queden plantas mal tratadas ; se debe esperar a que el producto actúe para corregir los errores en una segunda aplicación.

6. PRESENTACIÓN

TRILLA 800 SC se distribuye en bolsa de polietileno de alta densidad o en bolsa aluminizada por 1 kilogramo.

7. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO Y LA MANIPULACIÓN

ALMACENAMIENTO

Almacenar **TRILLA 800 SC** bajo llave en un lugar fresco, seco y ventilado, en sus envases y empaques originales, debidamente cerrados y con su etiqueta adherida para evitar posibles deterioros y accidentes. No almacenar en casa de habitación , ni almacenar o transportar cerca de alimentos para humanos y animales domésticos, fertilizantes, semillas y/o plaguicidas para evitar intoxicación y/o posteriores efectos en cultivos susceptibles a este tipo de herbicidas. Almacenado en los envases originales, bien tapados y en optimas condiciones **TRILLA 800 SC** tiene una fecha de vencimiento de 2 años.

INDICACIONES DE MANEJO

7.1 Lea la etiqueta antes de usar el producto.

7.2 Manténgase producto fuera del alcance de los niños.

7.3 Evite contaminar con **TRILLA 800 SC**. las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo humano o para riego de cultivos.



SC 5819-1



SA 136-1



OS 211437



Responsabilidad Integral®
Compromiso Social y Ambiental
con el Desarrollo Sostenible

7.4 En caso de contacto prolongado con la piel se pueden producir irritaciones. Cámbiese la ropa y los zapatos contaminados, lávese con abundante agua y jabón la parte afectada.

7.5 Después de la aplicación, lávese la piel con abundante agua y jabón, lo mismo que las ropas antes de usarlas de nuevo.

7.6 En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos.

7.7 En caso de ingestión debe hacerse lavado gástrico y no inducir el vómito.

7.8 Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta el agua en la mezcla de aplicación, luego destrúyalo bien sea mecánicamente o por incineración.

7.9 TRILLA 800 SC es un herbicida clasificado toxicológicamente como de CATEGORIA II, MODERADAMENTE PELIGROSO, DAÑINO.

8. CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Es importante en el manejo de este producto o material conocer la información de uso y seguridad y utilizar todo el contenido para evitar la generación de desperdicios. Se debe evitar verter este producto por los canales de aguas lluvias o al suelo.

En todo el ciclo se debe cumplir con la normatividad vigente relacionada con el manejo, uso y disposición de este producto o material en aras de prevenir la afectación del medio ambiente.

9. GARANTÍA

El fabricante garantiza que las características físico químicas del producto corresponden a las anotadas en esta etiqueta y que mediante registro oficial de venta, se verifico que es apto para los fines aquí recomendados, de acuerdo a las indicaciones de empleo.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Profesional Cargo: Tecnológico I Agroquímicos Fecha: 01/Mar/2011	Cargo: Líder Tecnológico Agroquímicos Fecha: 15/Dic/2011	Cargo: Sistema de Gestión Integral Fecha: 15/Dic/2011



SC 5819-1



SA 136-1



OS 211437



Responsabilidad Integral®
 Compromiso Social y Ambiental
 con el Desarrollo Sostenible