FICHA TECNICA **TUNDA SL**

NOMBRE COMERCIAL	**TUNDA SL**
INGREDIENTE ACTIVO	Sal isopropilamina de N-(phosphonomethyl) glycine
GRUPO QUÍMICO	Organofosforados
CONCENTRACIÓN	48 g/L
FORMULACIÓN	SL - (Concentrado Soluble en agua)
MODO DE ACCIÓN	Sistémico, pos emergente, no selectivo
FABRICANTE	
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR	AGROINSUMOS DEL CAFÉ S.A. Calle 73 N° 8 – 13 Piso 5 Torre A Tel: (57) – 1 2100888 Bogotá D.C. - Colombia
REGISTRO DE VENTA ICA N°	1701
PRESENTACIONES COMERCIALES	1, 4 Y 20 Litros - Tambores plásticos por 60 y 200 litros

PRINCIPALES CARACTERISTICAS **TUNDA SL** es un herbicida sistémico post emergente para el control total de malezas anuales y perennes de hojas anchas, gramíneas y ciperáceas. El herbicida cae en el suelo es inactivado mediante reacción química que ocurre con las arcillas, sin dejar residuos que pueden afectar las siembras posteriores, ni tampoco penetrar por las raíces de los cultivos ya establecidos. Los riesgos de causar daños a los cultivos vecinos se reducen considerablemente cuando las aplicaciones se realizan sin vientos, dirigido a las malezas y utilizando pantalla protectora para evitar que las gotas de aspersión caigan sobre las partes verdes de las plantas deseables, en el control de malezas en época de pos emergencia temprana, cuando las malezas no superen las tres hojas.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS	MALEZAS	DOSIS
PALMA AFRICANA POTREROS	Kikuyo, Trébol blanco, Mastuerso, Ambrosia o pasco, Guayacana, Bailico, Cerraja, Llanten, Barbasco, Lechosilla	4.0 L/Ha
CAFÉ CITRICOS CACAO BANANO PLATANO ARROZ	Bledo, Papunga, Botoncillo, Siempreviva, Guarda rocio, Pata de gallina, Falsa caminadora, Caminadora, Golondrina, Cadillo, Cortadera, Liendrepuerco, Arrocillo, Verdolaga	2.0 – 3.0 L/Ha
	Batatilla, Siempre viva, Arroz rojo, Rabo de zorro, Pasto pará, Cortadera, Pasto Guinea, Maciega, Pasto elefante, Pasto micay, Pasto Argentina, Coquito, Gramalote, Pajon, Pasto Johnson	4.0 – 6.0 L/Ha
	Batatilla, Siempre viva, Arroz rojo	2.0 L en 100 Litros de agua para control localizado

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: TUNDA SL debe aplicarse en época de pos emergencia temprana cuando las malezas tengan no más de tres hojas, máximo 10 dias después de la emergencia del arroz.

PREPARACION DE LA MEZCLA: Para preparar la mezcla de aspersión vierta en el tanque de preparación la dosis a utilizar de TUNDA SL, en la mitad del volumen de agua total a emplear. Adicione a esta mezcla la cantidad de agua requerida para completar el volumen de aspersión, agitando bien y de manera constante.

FITOTOXICIDAD: TUNDA SL no debe mezclarse con plaguicidas surfactantes o fertilizantes foliares sin antes hacer una prueba de compatibilidad.