Zampro® SC

Fungicida • Suspensión concentrada SC • Categoría toxicológica: II

BASF
The Chemical Company

Reg. ICA 0819

Ingrediente activo

Dimetomorf 225 g/l +
Ametoctradin 300 g/l.

Modo de acción

Zampro® SC es un fungicida sistémico con acción protectante y curativa.

Mecanismo de acción

• *Dimetomorf:* pertenece al grupo de los ácidos carboxílicos. Actúa en el patógeno inhibiendo la formación, germinación y liberación de las esporas. Inhibe la formación de precursores de la pared celular, lo que ocasiona la liberación del esporangio y la enlongación del esporangióforo.

• *Ametoctradin:* pertenece al grupo de las triazolo-pirimidilaminas. Lleva rápidamente a la desintegración de las zoosporas inhibiendo la liberación de las esporas y su germinación. Ingrediente activo único que interrumpe el ciclo reproductivo del patógeno.

Presentaciones

1 L.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Blanco biológico (Nombre científico y nombre común)	Dosis	Periodo de carencia	Periodo de reentrada
Papa	Gota o Lancha *(Phytophthora infestans)*	0.9 a 1.2 L/ha	7 días	12 horas
Tomate	Gota *(Phytophthora infestans)*	0.9 a 1.2 L/ha	7 días	12 horas
Cebolla	Cenicilla *(Peronospora destructor)*	0.9 a 1.2 L/ha	7 días	12 horas
Rosas	Mildeo velloso *(Peronospora sparsa)*	*1.2 cc/L (1.75 L/ha)	No aplica	Al secar el residuo de la aspersión en el follaje

* Volumen de agua 1500 L/ha.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Frecuencia y época de aplicación

Zampro® SC se debe aplicar de manera preventiva – curativa temprana o con la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad cada 4 a 7 días, dependiendo de la presión del patógeno o de las condiciones ambientales. Realizar máximo dos aplicaciones consecutivas y rotar con productos con diferente mecanismo de acción.

Equipos

Puede ser aplicado con equipo manual o mecánico con presión constante. Calibre el equipo antes de aplicar el producto. Para la aplicación utilice boquillas de cono sólido o con hueco. Lave el equipo después de cada jornada de trabajo.

Compatibilidad

Zampro® SC no debe ser mezclado con productos con reacción fuertemente alcalina.

Fitotoxicidad

Se recomienda realizar pruebas de fitocompatibilidad antes de usar las mezclas.

Contenido